

**Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.**

**1. Прогрессиентность алкоголизма оценивается по:**

- а) скорости нарастания изменений личности
- б) длительности запоев
- в) длительности ремиссий
- г) длительности периода от начала систематического пьянства до формирования алкогольного абстинентного синдрома

**2. По медицинским показаниям наркотики назначают:**

- а) онкологическим пациентам
- б) терапевтическим пациентам
- в) стоматологическим пациентам
- г) наркологическим пациентам

**3. К конечной стадии течения наркомании относится все перечисленное, кроме:**

- а) кахексии
- б) полной деградации личности
- в) абстиненции
- г) повышения толерантности

**4. При проведении предрейсового медицинского осмотра медицинские работники заполняют:**

- а) протокол контроля трезвости
- б) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения
- в) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения
- г) справка о состоянии освидетельствования

**5. ВИЧ-инфекция чаще возникает у наркоманов, употребляющих наркотики:**

- а) внутривенно
- б) перорально
- в) не зависимо от способа введения
- г) интраназально

**6. Полинаркомания – это:**

- а) одновременное злоупотребление несколькими наркотическими веществами
- б) повышение дозы наркотического вещества
- в) алкоголизм в сочетании с наркоманией
- г) употребление сильнодействующих препаратов

**7. Для первой стадии алкоголизма характерны все перечисленные симптомы, кроме:**

- а) утраты количественного
- б) роста толерантности
- в) амнезии отдельных периодов опьянения
- г) абстинентного синдрома

**8. Гарантированный объем помощи больным наркоманией включает:**

- а) обследование
- б) диагностику
- в) стационарное лечение
- г) санаторное лечение

**9. Для первой стадии алкоголизма наиболее характерна форма пьянства в виде:**

- а) постоянного пьянства на фоне повышенной толерантности
- б) коротких двух-трех дневных псевдозапоев
- в) частых однодневных эксцессов
- г) перемежающегося пьянства
- д) истинных запоев

**10. В третьей стадии алкоголизма наиболее часто встречаются следующие формы злоупотребления алкоголем:**

- а) постоянное пьянство с высокой толерантностью
- б) истинные запои
- в) псевдозапои
- г) постоянное пьянство с низкой толерантностью

**11. Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:**

- а) нарушения сознания, ориентировки
- б) нарушения походки
- в) неточности выполнения точных движений
- г) дрожания век, языка, пальцев рук

**12. Каким документом регламентированы стандарты оказания наркологической помощи:**

- а) Приказ Министерства здравоохранения № 704 от 12.09.88г.
- б) Приказы Министерства здравоохранения № 129, 131, 132, 133, 134, 135 от 04.09.2012г.
- в) Постановление Правительства РФ № 234-ПП от 12.09.2014г.
- г) Приказы Департамента здравоохранения № 346, 347, 348 от 04.09.2012г.

**13. Остаточные явления предшествующего алкогольного опьянения коррелируют с концентрацией алкоголя в крови:**

- а) 0,022 - 1%
- б) 1 - 2%
- в) 2 - 3%
- г) 3 - 4%

**14. Нерезко выраженные признаки абстинентного синдрома наблюдаются при употреблении:**

- а) опиатов
- б) препаратов конопли
- в) стимуляторов
- г) барбитуратов

**15. При купировании возбуждения в случаях отравления димедролом назначают:**

- а) прозерин и реланиум
- б) прозерин и дроперидол
- в) прозерин и аминазин
- г) тромал

**16. Основные признаки коматозного состояния:**

- а) падение гемодинамики
- б) угнетение дыхания
- в) потеря мышечного тонуса
- г) угнетение центральной нервной системы (ЦНС)

**17. Срок диспансерного наблюдения больных, с синдромом зависимости от наркотиков :**

- а) пять лет
- б) три года
- в) два года
- г) один год

**18. Состояние глоточного рефлекса при коме 2 степени:**

- а) сохранен
- б) снижен
- в) отсутствует
- г) усилен

**19. ЛСД относится к:**

- а) психостимуляторам
- б) производным конопли
- в) галлюциногенам
- г) опиатам

**20. Для абстиненции при употреблении опиатов характерны все перечисленные симптомы, кроме:**

- а) зуда в носу, чихания
- б) нарушения сна
- в) боли в суставах и мышцах
- г) сужения зрачков

**21. Для абстиненции при употреблении препаратов конопли характерно все перечисленное, кроме:**

- а) неприятных ощущений в сердце
- б) снижения настроения
- в) артериальной гипертензии
- г) тремора

**22. К группе агонистов опиатных рецепторов не относятся:**

- а) налоксон
- б) раствор из маковой соломки
- в) героин
- г) метадон

**23. Кустарно изготовленный первитин относится к:**

- а) опиатам
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногенам
- г) транквилизаторам

**24. Кокаин относится к:**

- а) седативным средствам
- б) психостимуляторам
- в) галлюциногенам
- г) препаратам конопли

**25. Метадон является:**

- а) нейролептиком
- б) психостимулятором
- в) опиоидным производным
- г) сильнодействующим веществом

**26. Сужение зрачков характерно для:**

- а) эфедроновой интоксикации
- б) опиоидного абстинентного синдрома
- в) гашишной интоксикации
- г) опиоидной интоксикации

**27. Для абстиненции при употреблении наркотиков стимулирующего ряда характерно все выше перечисленное, кроме:**

- а) ощущения разбитости
- б) сонливости днем, бессонницы ночью
- в) психотических эпизодов
- г) ломящих болей в суставах и мышцах

**28. Основными клиническими проявлениями алкогольной депрессии являются все перечисленное, кроме:**

- а) снижения настроения
- б) чувства тоски и тревоги
- в) идей самообвинения и самоуничтожения
- г) бреда ревности

**29. Для алкогольного бреда ревности характерно все выше перечисленное, кроме:**

- а) бреда преследования
- б) идеи отношения
- в) тревоги
- г) тактильных галлюцинаций

**30. Основными признаками алкогольного галлюциноза являются:**

- а) помрачение сознания
- б) полная амнезия психоза
- в) преобладание вербальных псевдогаллюцинаций
- г) преобладание истинных вербальных галлюцинаций

**31. Судорожные припадки в абстинентном синдроме характерны для:**

- а) опийной наркомании
- б) гашишной наркомании
- в) эфедроновой наркомании
- г) барбитуровой наркомании

**32. Уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт наркотиков предусмотрена статья УК РФ:**

- а) 119
- б) 167
- в) 228
- г) 235

**33. Характерными признаками при употреблении седативных препаратов являются все перечисленное, кроме:**

- а) бледности кожных покровов
- б) зрительных галлюцинации
- в) снижения тонуса мышц и рефлексов
- г) смазанности речи

**34. Для абстиненции при употреблении антипаркинсонических препаратов характерно все вышеперечисленное, кроме:**

- а) снижения настроения
- б) тремора
- в) тактильных галлюцинаций
- г) делириозных расстройств

**35. Результаты предрейсового медицинского осмотра заносятся в:**

- а) журнал контроля трезвости
- б) протокол осмотра водителя автотранспортного средства
- в) путевой лист
- г) протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения

**36. Штамп в путевом листе водителей ставится при:**

- а) допуске к работе
- б) наличии признаков употребления алкоголя
- в) наличии у водителей симптомов острого заболевания
- г) наличии признаков употребления наркотиков

**37. Все листы журнала контроля трезвости должны быть:**

- а) пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью организации и заверены подписью руководителя
- б) заверены только подписью медицинского работника, проводящего предрейсовый медицинский осмотр
- в) только пронумерованы
- г) заверены только подписью руководителя организации

**38. При опьянении, вызванном употреблением наркотических или сильнодействующих веществ, выявляется все перечисленное, кроме:**

- а) наличия следов инъекций
- б) акроцианоза, гипергидроза
- в) нистагма
- г) запаха алкоголя изо рта

**39. Наркоманы, отказывающиеся от лечения:**

- а) привлекаются к уголовной ответственности
- б) привлекаются к принудительному лечению
- в) к ответственности не привлекаются
- г) направляются на лечение в психиатрические больницы

**40. О распространенности пьянства и алкоголизма наиболее эффективно свидетельствует следующий показатель:**

- а) рождаемость
- б) смертность
- в) количество абсолютного алкоголя, потребляемого на душу населения в год
- г) количество состоящих на учете больных

**41. Максимальное угнетение дыхательного центра после внутривенного введения морфина развивается через:**

- а) 1 - 3 минуты
- б) 5 - 10 минут
- в) 15 - 20 минут
- г) 30 минут

**42. Поражение периферической нервной системы при алкоголизме проявляется:**

- а) полинейропатией
- б) рассеянным склерозом
- в) параличами
- г) парезами

**43. Наркологическая помощь наркологическим больным оказывается по:**

- а) просьбе больного
- б) просьбе и с согласия родителей или других законных представителей больного
- в) требованию общественных организаций по месту жительства больного
- г) требованию правоохранительных органов

**44. Наименьшим угнетающим действием на дыхательный центр обладает:**

- а) морфин
- б) омнопон
- в) промедол
- г) фентанил

**45. Условно-рефлекторная терапия алкоголизма направлена на:**

- а) выработку стойкого рефлекса отвращения к вкусу и запаху алкоголя
- б) повышение толерантности к алкоголю
- в) прерывание алкогольного эксцесса
- г) лечение абстинции

**46.Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации регламентируется:**

- а) правилами внутреннего распорядка в ЛПУ
- б) Указами Президента Российской Федерации
- в) Федеральным законом Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах
- г) уголовным кодексом

**47.С юридической точки зрения «производство» и «изготовление» наркотических средств – это:**

- а) синонимы
- б) разные понятия
- в) оборот наркотических средств
- г) реализация наркотических средств

**48.Под изготовлением наркотических средств подразумевается действия, направленные на:**

- а) серийное получение наркотических средств
- б) получение готовых к использованию и потреблению наркотических средств
- в) культивирование растительного сырья для дальнейшего изготовления наркотических средств
- г) изготовление психотропных препаратов

**49.К гепатопротекторам относятся:**

- а) галоперидол
- б) аминалон
- в) гептрал
- г) но-шпа

**50.Следы внутривенных инъекций обнаруживаются при употреблении:**

- а) барбитуратов
- б) галлюциногенов
- в) стимуляторов
- г) антипаркинсонических препаратов

**51.Максимальная толерантность к алкоголю развивается при алкоголизме:**

- а) в первой стадии заболевания
- б) во второй стадии заболевания
- в) в третьей стадии заболевания
- г) в состоянии алкогольной абстиненции

**52.Соматические изменения в III стадии алкоголизма:**

- а) отсутствуют
- б) носят характер функциональных нарушений
- в) носят необратимый характер
- г) носят характер вегетативных расстройств

**53.Ранним называется алкоголизм, формирующийся в период:**

- а) до 25 лет
- б) до 18 лет
- в) внутриутробного развития
- г) 6 – 7 лет

**54.Эфедрон чаще всего употребляется:**

- а) внутривенно
- б) внутримышечно
- в) путем курения
- г) путем ингаляции

**55.Алкогольная деградация личности проявляется:**

- а) ослаблением памяти и утратой критики
- б) разноплановостью мышления
- в) морально-этическим снижением
- г) эмоциональной амбивалентностью

**56.Для легкой степени алкогольного опьянения характерно:**

- а) нарушение поведения
- б) нарушение сознания и ориентировки
- в) нарушение походки
- г) тремор

**57.Осложненная наркомания – это сочетание зависимости от наркотиков и:**

- а) антибиотиков
- б) алкоголя
- в) глюкокортикоидов
- г) витаминных препаратов

**58.Социальные последствия наркологических заболеваний проявляются в:**

- а) способности выполнять в полном объеме семейные и производственные обязанности
- б) выраженном профессиональном снижении с утратой прежней квалификации
- в) иждивенческих тенденциях
- г) деградации личности

**59.Токсикомания – это заболевание, обусловленное употреблением:**

- а) химических токсических веществ
- б) психотропных препаратов
- в) алкоголя
- г) наркотиков

**60.Для интоксикации опиоидными наркотиками характерно:**

- а) бледность кожи
- б) покраснение кожи
- в) сужение зрачков
- г) расширение зрачков

**61.Алкоголь в организме в основном всасывается в:**

- а) желудке
- б) двенадцатиперстной кишке
- в) толстом кишечнике
- г) тощей кишке



**62.Основными признаками алкогольного параноида являются:**

- а) галлюцинаторные расстройства
- б) чувственный аффект страха
- в) бред преследования
- г) психические автоматизмы

**63.Эпилептиформный синдром при алкоголизме наиболее часто проявляется в виде:**

- а) больших судорожных припадков
- б) эпилептического слабоумия
- в) дисфорических состояний
- г) сумеречного помрачения сознания

**64.Основными признаки мусситирующего делирия являются:**

- а) глубокое помрачение сознания
- б) преобладание простых двигательных актов
- в) бредовое поведение
- г) вербальная продукция в виде бормотания
- д) наличие вербальных галлюцинаций
- е) наличие различных неприятных соматических ощущений в теле, на фоне пониженного настроения

**65.Основными клиническими признаками «профессионального» делирия являются:**

- а) бред преследования
- б) стереотипные автоматизированные действия
- в) слуховые галлюцинации
- г) ложные узнавания

**66.Повторное медицинское освидетельствование проводится по:**

- а) личному заявлению водителя
- б) направлению руководителя автотранспортного предприятия
- в) направлению медицинского работника
- г) направлению сотрудников ГИБДД

**67.К метаболитам алкоголя относятся:**

- а) ацетальдегид
- б) молочная кислота
- в) уксусная кислота
- г) масляная кислота

**68.Для средней степени алкогольного опьянения характерно все перечисленное, кроме:**

- а) нарушения речи
- б) нарушения походки
- в) неустойчивости в позе Ромберга
- г) слабого запаха алкоголя изо рта

**69.Для проведения лабораторных исследований биологических сред на содержание алкоголя используются:**

- а) алкометры
- б) газовые хроматографы
- в) метод Раппопорта
- г) тест-полоски

**70. Медицинские работники автотранспортных предприятий осуществляют:**

- а) контроль за состоянием здоровья водителей
- б) анализ причин отстранения водителей от работы
- в) участие в служебном расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
- г) проведение медицинских осмотров водителей

**71. В неизменном виде алкоголь выводится из организма:**

- а) печенью
- б) легкими
- в) почками
- г) молочными железами

**72. Переход от эпизодического к систематическому злоупотреблению алкоголем проявляется в:**

- а) учащении периодов опьянения
- б) изменении характера опьянения
- в) традиционно обусловленных эпизодах употребления алкоголя
- г) росте толерантности к алкоголю
- д) развитию выраженной интоксикации организма к алкоголю

**73. Начальный этап лечения алкоголизма предусматривает:**

- а) выработку условного рефлекса отвращения к алкоголю
- б) прерывание злоупотребления алкоголем
- в) устранение абстинентного синдрома
- г) снижение признаков возбудимости

**74. Для второй стадии алкоголизма наиболее характерны следующие признаки:**

- а) физическая и психическая зависимость от алкоголя
- б) алкогольный абстинентный синдром
- в) высокая толерантность к алкоголю
- г) алкогольная деградация личности

**75. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:**

- а) прогрессирующим течением
- б) отсутствием патологического влечения к алкоголю
- в) формированием абстинентного синдрома
- г) развитием стойких соматических, неврологических расстройств и деградацией личности

**76. Для наркомании характерно:**

- а) развитие физической и психической зависимости от наркотиков
- б) рост толерантности к наркотическим веществам
- в) выраженные изменения личности
- г) отсутствие абстинентного синдрома

**77. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении препаратов стимулирующего ряда являются:**

- а) приподнятое настроение
- б) повышение работоспособности
- в) болтливость
- г) острые бредовые состояния

**78. Клиническими признаками кокаиновой наркомании являются:**

- а) повышение интеллектуальной деятельности
- б) расширение зрачков, блеск глаз
- в) тактильные галлюцинации
- г) эпилептические припадки

**79. Расширение зрачков характерно для:**

- а) эфедроновой интоксикации
- б) барбитуровой интоксикации
- в) опийного абстинентного синдрома
- г) опийной интоксикации

**80. Клиническими проявлениями наркомании при употреблении галлюциногенов являются:**

- а) зрительные галлюцинации
- б) страх, подозрительность
- в) бредовые идеи преследования
- г) параличи нижних конечностей

**81. Характерными признаками интоксикации при употреблении кетамина являются:**

- а) психомоторное возбуждение
- б) зрительные и слуховые галлюцинации
- в) нарушение речи
- г) потеря способности запоминать текущие события

**82. Симптомы интоксикации при употреблении препаратов антипаркинсонического действия:**

- а) эйфория
- б) утрата реальности существования
- в) сценopodobные галлюцинации
- г) нарушение речи

**83. Симптомы, характерные для употребления летучих органических соединений (бензин, толуол, бензол, ацетон и т.д.):**

- а) сужение зрачков
- б) тахикардия
- в) нарушение координации движений
- г) дезориентировка

**84. Основные симптомы Корсаковского психоза:**

- а) полиневриты
- б) амнезия
- в) конфабуляции
- г) сохранность памяти

**85. К синдромам помрачения сознания могут быть отнесены следующие:**

- а) оглушение
- б) делирий
- в) онейроид
- г) психоорганический синдром

**86.Основными задачами предрейсовых медицинских осмотров являются выявление у водителей:**

- а) признаков употребления алкоголя
- б) признаков употребления наркотических средств и сильнодействующих веществ
- в) наличие у водителей симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания
- г) наличие у водителей хронических заболеваний

**87.Предрейсовые медицинские осмотры проводятся:**

- а) врачами
- б) фельдшерами
- в) медицинскими сестрами
- г) работниками автотранспортных предприятий

**88.В кабинеты экспертизы опьянения после проведения предрейсового медицинского осмотра водителя направляются в случаях:**

- а) противоречивости данных клинического и лабораторного исследования
- б) согласия водителя с заключением проведенного контроля трезвости
- в) неясной или неполной клинической картины опьянения
- г) сомнительных результатов лабораторного исследования

**89.В «группу риска» входят водители:**

- а) склонные к употреблению психоактивных веществ
- б) длительно и часто болеющие
- в) старше 40 лет
- г) старше 55 лет

**90.Для водителей «группы риска» проводятся медицинские осмотры:**

- а) предрейсовые
- б) текущие
- в) послерейсовые
- г) еженедельные

**91.К обороту наркотических средств относятся:**

- а) культивирование растений, содержащих наркотические вещества естественного происхождения
- б) производство и изготовление наркотических средств
- в) хранение, перевозка и пересылка наркотических средств
- г) пропаганда употребления наркотиков

**92.К основным принципам антиалкогольной терапии относятся:**

- а) непрерывность и длительность
- б) комплексность
- в) максимальная индивидуальность
- г) принудительность

**93. Клинические проявления алкогольного абстинентного синдрома:**

- а) тремор, потливость
- б) психическая напряжённость
- в) упорное отсутствие сна
- г) повышение аппетита
- д) сухость кожи
- е) влечение к опохмелению

**94. Наркомания - это заболевание, вызванное употреблением:**

- а) опиатов
- б) препаратов конопли
- в) препаратов стимулирующего действия
- г) сильнодействующих препаратов
- д) препаратов седативного действия

**95. К клиническим проявлениям наркомании при употреблении препаратов конопли относят:**

- а) ощущение легкости движений
- б) психомоторное возбуждение
- в) расстройство сознания, бред, галлюцинации
- г) благодушие, расслабленность

**96. Какие лабораторные исследования применяются для подтверждения ремиссии у больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя:**

- а) определение уровня прямого билирубина в крови
- б) анализ на карбогидрат-дефицитный трансферрин методом капиллярного электрофореза (CDT)
- в) определение уровня креатинина в крови
- г) определение уровня глюкозы в крови

**97. Основные симптомы энцефалопатии Гайе-Вернике:**

- а) нарушение сознания
- б) психотические расстройства
- в) гиперкинезы
- г) отсутствие неврологических расстройств

**98. При химико-токсикологических исследованиях для определения наркотических или сильнодействующих веществ в биологических средах организма используют:**

- а) тест-полоски
- б) газожидкостную и тонкослойную хроматографию
- в) иммуноферментный анализ
- г) алкометры

**99. Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров должно иметь:**

- а) мебель (кушетка медицинская, письменный стол, стол и т.д.)
- б) электрокардиограф
- в) приборы для определения алкоголя в биологических средах организма
- г) тест-полоски

**100.** Для вынесения заключения о факте употребления наркотического вещества обязательным является:

- а) заявление испытуемого об употреблении наркотического вещества
- б) обнаружение наркотического вещества в биологических средах организма
- в) представление врачу сведений об употреблении испытуемым наркотического вещества
- г) выявление клиники опьянения (одурманивания), вызванного употреблением наркотических веществ