

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1. Дефицит пульса – это термин, обозначающий:

- а) урежение пульса
- б) учащение пульса
- в) учащение пульса на вдохе и урежение его на выдохе
- г) разницу между частотой сердечных сокращений и периферическим пульсом

2. Суточные колебания температуры тела в пределах 1 градуса характерны для лихорадки:

- а) постоянной
- б) послабляющей
- в) перемежающейся
- г) гектической

3. Тахикардия – это число сердечных сокращений в минуту:

- а) менее 60
- б) 60–70
- в) 70–80
- г) более 90

4. Образованию пролежней способствует:

- а) сдавление тканей гипсовой повязкой
- б) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
- в) активное положение пациента в постели
- г) пассивное положение пациента в постели

5. Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:

- а) Нечипоренко
- б) Зимницкому
- в) Ребергу
- г) Аддис-Каковскому

6. Анализ мочи по Нечипоренко подсчитывает количество:

- а) эритроцитов
- б) суточной мочи
- в) эритроцитов и лейкоцитов в 1 мл мочи
- г) глюкозы

7. Психологическая помощь депрессивным пациентам пожилого возраста заключается в:

- а) гиперопеке
- б) психотерапевтической беседе
- в) изоляции
- г) беседе о данном заболевании, его осложнениях

8. На процесс установления и развития контактов между людьми влияют:

- а) восприятие и понимание людьми друг друга
- б) социальные условия
- в) самочувствие человека, состояние его здоровья
- г) материальная заинтересованность

9.Основным морфологическим проявлением изменений в органах при старении считается:

- а) атрофия
- б) гиперпластические процессы
- в) остеопороз
- г) астения

10.Приоритетная проблема пациента при почечной колике:

- а) тошнота
- б) субфебрильная температура
- в) боль в пояснице
- г) одышка

11.Физические нагрузки больному сахарным диабетом рекомендуется выполнять:

- а) до еды
- б) после еды
- в) после инъекции инсулина
- г) не имеет значения

12.Моча цвета «мясных помоев» - это:

- а) протеинурия
- б) лейкоцитурия
- в) микрогематурия
- г) макрогематурия

13.Пальцевое исследование прямой кишки должно проводиться всем пациентам, начиная с:

- а) 30 лет
- б) 40 лет
- в) 50 лет
- г) 60 лет

14.Истощение пациента, чувство переполнения в эпигастрии, рвота при язвенной болезни – это симптом:

- а) малигнизации
- б) пенетрации
- в) стеноза привратника
- г) клинического кровотечения

15.В зависимости от вида анафилактического шока могут развиваться:

- а) ларингоспазм
- б) бронхоспазм
- в) снижение АД
- г) стенокардия

16.Поллиноз – аллергическое заболевание, вызываемое:

- а) шерстью животных
- б) пылью растений
- в) домашней пылью
- г) продуктами питания

17.Вираз туберкулезной пробы – это:

- а) общая аллергическая реакция на туберкулин
- б) впервые выявленная положительная реакция Манту
- в) местная аллергическая реакция на туберкулин
- г) папула более 5 мм в диаметре

18. Обычное количество вдохов (доз) сальбутамола (вентолин, беротека) для купирования приступа бронхиальной астмы:

- а) 2–3 дозы
- б) 3–4 дозы
- в) 5–10 доз
- г) нет ограничений

19. Кризис – это:

- а) резкий подъем температуры
- б) длительная высокая лихорадка
- в) постепенное снижение температуры
- г) резкое снижение температуры

20. Некроз развивается при попадании под кожу или в мышцу:

- а) глюконата кальция
- б) хлорида калия
- в) глюкозы
- г) хлорида кальция

21. Ирригоскопия – это:

- а) рентгенологическое исследование толстой кишки
- б) эндоскопическое исследование толстой кишки
- в) рентгенологическое исследование тонкой кишки
- г) УЗИ брюшной полости

22. Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает в себя:

- а) обильное питье
- б) психоэмоциональную подготовку
- в) очистительную клизму
- г) определение уровня билирубина крови

23. Экстренное извещение подается после выявления больного с инфекцией в течение (в часах):

- а) 1
- б) 2
- в) 12
- г) 24

24. Для диагностики ВИЧ-инфекции используется:

- а) иммуноферментный анализ
- б) гемокультура
- в) анализ кала на бактериологическое исследование
- г) общий анализ крови

25. При чесотке характерным субъективным симптомом является:

- а) зуд вечером и ночью
- б) появление уртикарий

- в) пигментация в очагах
- г) депигментация в очагах

26. Для исследования мочи на содержание сахара необходимо собрать:

- а) утреннюю мочу
- б) суточную мочу
- в) среднюю порцию первого мочеиспускания
- г) любую порцию мочи в течение суток

27. Грелка необходима после подкожного введения:

- а) водного раствора
- б) масляного раствора
- в) вакцины
- г) триггера

28. Положение пациента, которое он не в состоянии самостоятельно поменять называется:

- а) вынужденное
- б) активное
- в) дренажное
- г) пассивное

29. Карантин при чуме составляет (количество дней):

- а) 5
- б) 6
- в) 7
- г) 10

30. Средства для лечения педикулеза:

- а) спрегаль, бензил бензоат, метиловый спирт
- б) ПАРАплюс, ниттифор, медифокс
- в) фторокорт, синафлан, микозолон
- г) лококортен, флюцинар, беласалик

31. Антигипертензивное средство, которое дает побочное действие в виде сухого кашля, - это:

- а) атеналол
- б) верапамил
- в) эналаприл
- г) эгилек

32. Приоритетные проблемы пациента – это проблемы:

- а) которые нужно решать в первую очередь
- б) которые можно предвидеть
- в) которые были в прошлом
- г) взаимоотношения между пациентом и медицинской сестрой

33. После обработки антисептиком полости рта тяжелобольным губы и язык необходимо смазывать:

- а) масляным раствором
- б) физиологическим раствором
- в) раствором бриллиантовой зелени

г) раствором хлоргексидина

34. Требования к лабораторной посуде для сбора мокроты на общий анализ:

- а) охлажденная
- б) стерильная
- в) продезинфицированная
- г) механически и химически чистая

35. Больного для постановки очистительной клизмы нужно уложить на:

- а) левый бок
- б) правый бок
- в) живот
- г) спину

36. Основная цель сестринского вмешательства при подготовке больного к УЗИ брюшной полости:

- а) устранение метеоризма
- б) устранение запоров
- в) освобождение мочевого пузыря
- г) заполнение мочевого пузыря

37. Местное противосвертывающее действие пиявок основано на содержании в ее слюне:

- а) гепарина
- б) гентомицина
- в) гирудина
- г) гиалуроновой кислоты

38. Отек всего тела называется:

- а) асцит
- б) анурия
- в) анасарка
- г) отек Квинке

39. Возбудитель краснухи особенно опасен для:

- а) детей раннего возраста
- б) подростков
- в) пожилых детей
- г) беременных женщин

40. Больной гриппом наиболее заразен:

- а) весь период болезни
- б) первые 2-3 дня от начала болезни
- в) с последних дней инкубационного периода
- г) в стадии выздоровления

41. Апраксия, нарушение навыков самоухода в большей степени характерны для:

- а) шизофрении
- б) сосудистой деменции
- в) болезни Альцгеймера
- г) депрессии

42. Некроз – это:

- а) недостаток питания тканей
- б) разрастание соединительной ткани
- в) омертвление тканей
- г) избыточное питание тканей

43. У здорового человека с мочой выделяется потребляемой жидкости в %:

- а) 50
- б) 50–70
- в) 70–80
- г) 100

44. Температура лекарственного раствора при закапывании в ухо (в градусах по Цельсию):

- а) 20–22
- б) 24–30
- в) 37–38
- г) 42–45

45. Уменьшение содержания в крови нормальных лейкоцитов - это:

- а) лейкоз
- б) лейкопения
- в) лейкоцитоз
- г) лейкемия

46. При первом обследовании пульс надо считать в течение (время в секундах):

- а) 10
- б) 15
- в) 30
- г) 60

47. При хроническом гломерулонефрите в стадии стихающего обострения назначается вариант диеты:

- а) с пониженным количеством белка
- б) с повышенным количеством белка
- в) с пониженной калорийностью
- г) основной стандартной

48. При одновременном приеме 2-х и более пероральных лекарств пациент должен принять их:

- а) сразу все вместе
- б) с интервалом в 1 минуту
- в) с интервалом в 5 минут
- г) с интервалом в 10- 15 минут

49. Преимущественным способом введения лекарственных препаратов при оказании неотложной помощи пациенту является:

- а) внутривенный
- б) сублингвальный
- в) внутримышечный
- г) ингаляционный

50. Абстиненция - это:

- а) привыкание к лекарственному средству
- б) физическая лекарственная зависимость
- в) кумуляция лекарственного средства
- г) идиосинкразия

51. Выберите признаки отёков при заболеваниях сердца:

- а) более выраженные с утра на лице, бледные, мягкие
- б) усиливающиеся к вечеру на ногах, сочетающиеся с акроцианозом
- в) плотные, не оставляющие ямку при надавливании
- г) мягкие, появляются вечером на лице

52. При назначении мочегонных препаратов (салуретиков) отмечается следующий электролитный сдвиг:

- а) гипокальциемия
- б) гипокалиемия
- в) гиперкальциемия
- г) гиперкалиемия

53. Активный искусственный иммунитет формируется после:

- а) введения иммуноглобулинов
- б) введения вакцин
- в) рождения
- г) перенесенного заболевания

54. Для постановки серологической реакции берут:

- а) кал
- б) мочу
- в) кровь
- г) желчь

55. Постельный режим больным с пневмонией назначается:

- а) на первые три дня заболевания
- б) только при тяжелом течении заболевания
- в) в течение всего лихорадочного периода
- г) в течение недели

56. Диспансерное наблюдение за больными острой пневмонией осуществляется в течение (месяцев):

- а) 2
- б) 3
- в) 6
- г) 12

57. Клинически отек Квинке проявляется в виде:

- а) большого, плотного, зудящего инфильтрата
- б) сливающейся зудящей сыпи
- в) большого, бледного, плотного, незудящего инфильтрата
- г) болезненного, плотного, гиперемированного инфильтрата

58. При ожирении назначается вариант диеты:

- а) основной стандартной

- б) с пониженным количеством белка
- в) с пониженной калорийностью
- г) с механическим и химическим щажением

59.Парентеральное питание – это введение лекарственных препаратов:

- а) минуя желудочно-кишечный тракт
- б) ингаляционно
- в) через рот
- г) ректально

60.Заболевание сердечно – сосудистой системы, которое является одной из основных причин смертности среди взрослого населения:

- а) артериальная гипертония
- б) ишемическая болезнь сердца
- в) пороки сердца
- г) ревматизм

61.Дискинезия желчевыводящих путей – это:

- а) расстройство двигательной функции желчного пузыря
- б) воспаление слизистой оболочки желчного пузыря
- в) скопление лямблий в желчном пузыре
- г) сужение желчного пузыря

62.Паллиативную помощь больному СПИДом начинают в случае:

- а) остановки питания
- б) инсульта, инфаркта миокарда
- в) если жизненно важные органы перестают работать и отказа больного от специфического лечения
- г) диабетической комы

63.Больной в стационаре на дому должен наблюдаться:

- а) ежедневно
- б) через день
- в) раз в неделю
- г) 2 раза в день

64.Страх смерти является проблемой:

- а) психологической
- б) физиологической
- в) социальной
- г) духовной

65.Дренажное положение придается пациенту для:

- а) снижения лихорадки
- б) уменьшения одышки
- в) расширения бронхов
- г) облегчения оттока мокроты

66.Антропометрия включает измерение:

- а) роста, остроты зрения, силы, остроты слуха
- б) роста, веса
- в) роста, веса, частоты дыхательных движений

г) роста, веса, артериального давления

67. Ранним проявлением скрытых отеков является:

- а) гидроторакс
- б) гидроперикард
- в) увеличение живота
- г) увеличение массы тела и уменьшение суточного диуреза

68. У пациента после перенесенной ангины появились отеки на лице, повысилось артериальное давление – это признаки:

- а) острого пиелонефрита
- б) острого гломерулонефрита
- в) ревматизма
- г) гипертонической болезни

69. Для диагностики заболеваний опорно – двигательного аппарата максимально информативны методы:

- а) радиоизотопные
- б) рентгенологические
- в) лабораторные
- г) ультразвуковые

70. Липодистрофия – это:

- а) атрофия мышечной ткани
- б) атрофия подкожно-жировой клетчатки
- в) атрофия кожи
- г) дегенерация хряща

71. Если анафилактический шок развился при внутривенной инъекции, то в первую очередь необходимо:

- а) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать
- б) введение препарата прекратить, из вены не выходить
- в) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, пунктировать другую вену
- г) введение препарата прекратить, иглу из вены убрать, холод на место инъекции

72. Воспалительное заболевание слизистой оболочки глаза:

- а) блефарит
- б) конъюнктивит
- в) миопия
- г) пресбиопия

73. При лучевых ожогах чаще поражается:

- а) хрусталик
- б) сетчатки
- в) роговица
- г) конъюнктивы

74. Рекомендуемое положение больного с геморрагическим инсультом:

- а) опустить голову
- б) возвышенное положение головы
- в) приподнять ножной конец
- г) не менять положение головы

75.Отоскопия – это осмотр:

- а) глотки
- б) гортани
- в) уха
- г) носа

76.Насадка на дозированные ингаляторы, применяемые для аэрозольтерапии – это:

- а) языкодержатель
- б) роторасширитель
- в) спейсер
- г) воздуховод

77.Медицинская сестра, перепутав внешне похожие флаконы, ввела вместо гепарина большую дозу инсулина, в результате чего наступило резкое ухудшение состояния (гипогликемическая кома). Действия медсестры оцениваются как:

- а) халатность
- б) медицинская ошибка
- в) случайная оплошность
- г) профессиональная некомпетентность

78.Нормальное АД находится в интервале (в мм рт. ст.):

- а) 100/60-140/95
- б) 120/80-130/90
- в) 100/60-139/89
- г) 110/70-150/85

79.Кровь на биохимический анализ берется:

- а) в любое время суток
- б) утром натощак
- в) утром после завтрака
- г) перед обедом

80.При желтухе первыми желтеют:

- а) кожные покровы
- б) слизистые оболочки
- в) стопы
- г) ладони

81.Подготовка пациента к эзофагогастродуоденоскопии включает:

- а) голод в течение суток перед обследованием, накануне прием слабительных
- б) строго натощак, накануне вечером – очистительная клизма
- в) строго натощак, вечером накануне легкий ужин (до 20 часов), не курить
- г) строго натощак, накануне прием слабительных, не курить

82.Осложнения внутримышечных инъекций:

- а) флегмона, воздушная эмболия
- б) абсцесс, паралич седалищного нерва, поломка иглы
- в) флебит, тромбофлебит, пирогенная реакция
- г) некроз, гематома, липодистрофия

83.При недостаточном содержании йода в пище развивается:

- а) диффузный токсический зоб

- б) ожирение
- в) сахарный диабет
- г) эндемический зоб

84. Вербальные средства передачи информации:

- а) мимика, визуальный контакт
- б) поза, жесты, интонация
- в) речь, письмо
- г) пантомимика, взгляд

85. По стандарту профилактики пролежней положение тяжелобольного в постели нужно менять:

- а) каждый час
- б) каждые 2 часа
- в) каждые 4 часа
- г) как можно чаще

86. Электрод, маркированный красным цветом, накладывается на:

- а) левую руку
- б) правую руку
- в) левую ногу
- г) правую ногу

87. Признаками правильного наложения венозного жгута является:

- а) конечность синее, отекает, теплая на ощупь
- б) отсутствие каких-либо изменений со стороны конечности
- в) прекращение кровотечения
- г) конечность бледная, холодная, исчезает пульс ниже жгута

88. Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию сердца включает:

- а) промывание желудка
- б) очистительная клизма
- в) разъяснение сущности исследования
- г) проведение бронхоскопии

89. Прием жидкости больным сахарным диабетом:

- а) следует ограничивать
- б) не следует ограничивать
- в) ограничивают прием жидкости два раза в неделю
- г) ограничивают прием жидкости три раза в неделю

90. Врачебную тайну составляет информация:

- а) о факте обращения гражданина за медицинской помощью
- б) о состоянии здоровья гражданина
- в) любая информация о личной жизни гражданина, полученная при обследовании и лечении
- г) о состоянии здоровья родственников

91. Приоритетом в сохранении здоровья ребёнка в системе первичной медико-санитарной помощи является:

- а) лекарственное обеспечение
- б) диагностика заболеваний

- в) профилактическая работа
- г) лечение заболеваний

92.Для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют:

- а) витамины
- б) вакцины
- в) антибиотики
- г) пробиотики

93.Активный естественный иммунитет формируется после:

- а) вакцинации
- б) приёма препаратов интерферона
- в) перенесенного инфекционного заболевания
- г) введения иммуноглобулина

94.Анатомо-физиологической особенностью костной системы у детей грудного возраста является:

- а) высокая плотность костной ткани
- б) высокое содержание минеральных солей
- в) обилие хрящевой ткани в скелете
- г) наличие тонкой надкостницы

95.Особенностью дыхательной системы у здоровых детей раннего возраста является:

- а) хорошее развитие с рождения придаточных пазух носа
- б) гортань воронкообразная узкая, голосовые связки короткие
- в) отсутствие сурфактанта в альвеолах
- г) гортань воронкообразная широкая, голосовые связки короткие

96.На первом году жизни длина тела ребёнка в среднем увеличивается на:

- а) 10 см
- б) 15 см
- в) 20-25 см
- г) 30 см

97.Неинфекционное заболевание кожи у детей:

- а) пемфигус
- б) везикулопустулёз
- в) фурункулёз
- г) потница

98.В плановой профилактике столбняка используют:

- а) анатоксин
- б) противостолбнячную сыворотку
- в) антибиотики
- г) гамма-глобулин

99. Биологический возраст ребёнка оценивается по:

- а) зонам роста костной ткани
- б) массе тела
- в) интеллекту
- г) росту

100. Первый этап скрининг-программы включает проведение:

- а) флюорографии
- б) электрокардиографии
- в) антропометрии
- г) энцефалографии

101. Симптом железодефицитной анемии:

- а) строфулюс
- б) бледность кожи и слизистых оболочек
- в) одышка, цианоз
- г) лихорадка, тошнота

102. Первоочередное независимое сестринское вмешательство перед вакцинацией:

- а) измерение температуры тела
- б) проведение психологической подготовки
- в) измерение артериального давления
- г) исследование крови

103. Формированию нервно-психического здоровья детей способствуют:

- а) стрессовые ситуации, эмоциональные игры
- б) пассивное курение в семье
- в) развивающие игры, словесный контакт с ребёнком
- г) отказ от профилактических прививок

104. Клинический признак посттравматического стрессового расстройства при тяжёлой адаптации ребёнка в детском дошкольном учреждении:

- а) активная игра со сверстниками
- б) хороший аппетит
- в) развитие неврозов
- г) спокойный сон

105. Сестринские рекомендации при атопическом дерматите у детей:

- а) сохранение естественного вскармливания
- б) ежедневный контроль массы тела
- в) приём антигистаминных препаратов
- г) ограничение пребывания на свежем воздухе

106. Продукты, рекомендуемые при нервно-артритической конституции:

- а) овощи, фрукты, молочные продукты
- б) мясные супы, субпродукты

- в) рыбные консервы
- г) шоколад, какао

107.К физиологическому состоянию новорождённого относится:

- а) синдром дыхательных расстройств
- б) мастопатия
- в) пемфигус
- г) кефалогематома

108.Риск развития сепсиса у новорождённого ребёнка связан с наличием:

- а) кандидозного стоматита
- б) резус-конфликта
- в) омфалита
- г) физиологической эритемы

109.Оптимальной лактации способствует:

- а) кормление строго по часам
- б) «свободное» вскармливание
- в) исключение ночного кормления
- г) ограничение питьевого режима кормящей матери

110.Преимущество женского молока:

- а) оптимальное соотношение кальция и фосфора
- б) большое количество минеральных солей
- в) отсутствие бифидус-фактора
- г) высокое содержание казеина

111.Сестринская рекомендация при лактостазе:

- а) исключить сцеживание молока
- б) отказаться от грудного вскармливания
- в) чаще прикладывать ребенка к груди, сцеживать молоко
- г) назначить фитотерапию

112.Назовите основной вид расстройства интеллекта:

- а) нарушение сна
- б) снижение памяти
- в) деменция, умственная отсталость
- г) бредовое расстройство, амнезия

113.Сестринская рекомендация при рахите:

- а) проведение лечебного массажа и солевых ванн
- б) приём микроэлементов
- в) ежедневные прогулки на свежем воздухе
- г) обеспечение гипоаллергенной диеты

114.«Холодовая цепь» это -:

- а) система хранения вакцин на их производстве
- б) осложнение вакцинации
- в) система транспортировки и хранения вакцин
- г) снижение температуры хранения вакцин до 0°C

115. Специфическая профилактика рахита включает:

- а) проведение массажа и гимнастики
- б) приём витамина Д
- в) рациональное питание
- г) водные процедуры

116. Симптом дыхательной недостаточности при пневмонии у детей:

- а) брадипноэ
- б) кашель
- в) периоральный цианоз
- г) потливость

117. Положение грудного ребенка в кроватке при наличии у него ринита:

- а) на спине
- б) на животе
- в) на боку с подушкой под голову
- г) на боку без подушки

118. Марлевые маски рекомендуется менять:

- а) через каждый час
- б) каждые 2-3 часа
- в) каждые 4-5 часов
- г) 2 раза в сутки

119. Диетотерапия при гломерулонефрите предполагает:

- а) увеличение питьевого режима
- б) ограничение соли и жидкости
- в) дополнительное введение мяса, рыбы
- г) ограничение овощных и фруктовых блюд

120. Профилактика энтеробиоза:

- а) проведение соскоба с перианальных складок
- б) взятие кала на яйца гельминтов
- в) соблюдение специфической диеты
- г) проведение общего анализа мочи

121. С целью профилактики гельминтозов у детей медсестра рекомендует:

- а) лабораторное исследование кала и мочи
- б) проведение профилактического лечения «Вермоксом»
- в) соблюдение правил личной гигиены
- г) проведение обследования у инфекциониста-паразитолога

122.Диетотерапия при хроническом гастродуодените включает:

- а) отварное мясо, рыбу
- б) мясные, рыбные и грибные бульоны
- в) свежий хлеб и различную выпечку
- г) апельсины, киви, мандарины

123.Клинический симптом краснухи:

- а) мелкопятнистая сыпь
- б) везикулёзная сыпь
- в) увеличение слюнных желёз
- г) приступообразный кашель

124.Сестринские рекомендации при ветряной оспе включают:

- а) проведение ежедневных гигиенических ванн
- б) ограничение витаминизированного питья
- в) изоляцию ребёнка, стрижку ногтей
- г) измерение диуреза, артериального давления

125.Принцип лечения острых кишечных инфекций:

- а) уменьшение объёма питания, увеличение приема жидкости
- б) уменьшение кратности приема пищи
- в) введение диуретиков
- г) прием пребиотиков вместо приёма антибиотиков

126.Доза лекарственного вещества, вызывающая отравление без смертельного исхода это:

- а) высшая разовая доза
- б) высшая суточная доза
- в) токсическая доза
- г) летальная доза

127.Доля дозы лекарственного средства взрослого, которая требуется на каждый год жизни ребенка:

- а) 1/2
- б) 1/10
- в) 1/20
- г) 1/50

128.Наиболее частые заболевания конъюнктивы:

- а) дистрофические поражения
- б) опухоли
- в) воспаления
- г) врожденные аномалии

129.Жалобы при халязионе:

- а) зуд краев век
- б) локальная боль в области ресничного края век
- в) отсутствуют
- г) уплотнение в толще века

130. Местным лечением блефарита является:

- а) сухое тепло, прижигание 70% спиртом, закапывание 30% раствора сульфацил-натрия, закладывание витаминных мазей
- б) закладывание рассасывающих мазей
- в) прижигание краев век, закладывание рассасывающих мазей, массаж
- г) хирургическое

131. Локализация ячменя:

- а) слезная железа у корня ресницы
- б) мейбомиева железа в толще хряща
- в) слезная железа
- г) слезный мешок

132. Измерение внутриглазного давления при глаукоме проводится:

- а) тонометром Маклакова
- б) сфигмоманометром
- в) аппаратом Боброва
- г) периметром

133. Термические ожоги могут быть вызваны:

- а) дождём
- б) льдом, пламенем
- в) ветром
- г) туманом

134. Тупая травма глаза сопровождается:

- а) кровотечением
- б) разрывом оболочек глаза
- в) слюнотечением
- г) кровотечением, разрывом оболочек глаза

135. Порог слышимости при лёгкой степени тугоухости составляет:

- а) не более 50 децибел
- б) 60 децибел
- в) 70-80 децибел
- г) свыше 80 децибел

136. Какие повязки необходимо накладывать на доврачебном этапе при термических ожогах II степени:

- а) мазовые
- б) сухие асептические
- в) фурацилиновые
- г) полу спиртовые

137. Алкогольная абстиненция – это:

- а) присутствие алкоголя в крови
- б) психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм
- в) алкогольное поражение печени
- г) алкогольная эпилепсия

138. Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:

- а) прогрессивным течением
- б) развитием патологического влечения к алкоголю
- в) формированием абсинтентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
- г) развитием стойких соматических и неврологических расстройств и психической деградации личности

139. Характерные признаки рака молочной железы:

- а) боль при пальпации, симптомы морщинистой кожи
- б) гиперемия кожи
- в) втягивание соска, симптом лимонной корки
- г) выделение кровянистой жидкости из соска

140. Осмотр молочной железы пациентки проводят в положении:

- а) стоя с опущенными руками
- б) сидя
- в) лежа
- г) стоя, положив руки пациентки на пояс или голову

141. Выберите оптимальный путь введения лекарственных препаратов при неосложненном гипертензивном кризе:

- а) сублингвальный
- б) пероральный
- в) парентеральный

142. Механизмы возникновения геморрагического инсульта:

- а) разрыв измененного сосуда
- б) разрыв аневризмы сосудов мозга
- в) падение артериального давления
- г) стеноз, окклюзия магистральных сосудов головы и шеи

143. Клинические признаки характерные для ишемического инсульта (неэмболического):

- а) острое внезапное начало с потерей сознания, развитием глубокой комы
- б) постепенное развитие с предвестниками
- в) преобладание очаговых симптомов над общемозговыми
- г) оглушенность или сохранение сознания
- д) грубо выражены менингеальные симптомы

144. Для геморрагического инсульта характерно:

- а) быстрое обратное развитие очаговой симптоматики
- б) «мерцание симптомов»
- в) наличие крови в ликворе
- г) частый летальный исход
- д) сохраненное сознание

145. Для сотрясения мозга характерна следующая симптоматика:

- а) потеря сознания более 12 часов
- б) бледность
- в) повторная рвота
- г) ретроградная амнезия

146. Неотложная помощь при черепно-мозговой травме заключается в применении:

- а) наркотиков
- б) противорвотных препаратов
- в) пузыря со льдом на голову
- г) кордиамина

147. При переломах костей таза пациента транспортируют в положении:

- а) на спине на мягких носилках
- б) на спине на щите в положении лягушки
- в) на животе
- г) полусидя

148. При переломе бедра необходимо фиксировать:

- а) тазобедренный сустав
- б) тазобедренный и коленный суставы
- в) тазобедренный, коленный, голеностопный суставы
- г) место перелома

149. Смена белья больным должна проводиться не реже 1 раза в:

- а) 5 дней
- б) 7 дней
- в) 10 дней
- г) 14 дней

150. Паллиативная помощь:

- а) создает условия для легкой смерти
- б) улучшает качество жизни
- в) обеспечивает диагностический процесс