

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1. Текущая уборка перевязочной осуществляется:

- а) в начале и в конце рабочего дня
- б) в начале рабочего дня
- в) в конце рабочего времени
- г) 1 раз в неделю

2. Стерильность бикса с фильтром сохраняется в течение:

- а) 6 часов
- б) 3 дней
- в) 20 дней
- г) 24 часов

3. Тактика фельдшера при носовом кровотечении:

- а) коагуляция сосудов слизистой оболочки носа
- б) задняя тампонада
- в) передняя тампонада, холод на переносицу
- г) наложение пращевидной повязки

4. Способом временного гемостаза при венозном кровотечении является:

- а) наложение жгута
- б) наложение давящей повязки
- в) прошивание сосуда
- г) перевязка сосуда

5. Способом временного гемостаза при артериальном кровотечении является:

- а) наложение жгута
- б) наложение давящей повязки
- в) прошивание сосуда
- г) перевязка сосуда

6. При легочном кровотечении пациенту нужно придать положение:

- а) полусидя
- б) горизонтальное без подушки
- в) на животе
- г) на левом боку

7. Клиническим признаком кровотечения из тонкого кишечника является:

- а) кровавая рвота
- б) чёрный стул
- в) алая кровь на каловых массах
- г) гематурия

8. Симптомами кровопотери являются:

- а) повышение артериального давления (АД), частый и напряженный пульс
- б) повышение артериального давления (АД), нормальный пульс
- в) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс
- г) снижение артериального давления (АД), нормальный пульс

9. Антракоз – профессиональное заболевание:

- а) укладчиков асфальта
- б) прядильщиц
- в) шахтеров
- г) водолазов

10. Профессиональным заболеванием ныряльщиков, стеклодувов, музыкантов духовых инструментов является:

- а) анемия
- б) пневмосклероз
- в) эмфизема легких
- г) гемосидероз

11. Если при определении группы крови с помощью антицеликлонов агглютинация отсутствует в обоих каплях, то группа крови:

- а) четвёртая
- б) первая
- в) третья
- г) вторая

12. Температура капель для введения в ухо:

- а) 4 – 8° (из холодильника)
- б) 18 – 24° (комнатная температура)
- в) 37 – 38°
- г) 40 – 42°

13. При растяжении связок голеностопного сустава с целью фиксации накладывается:

- а) колосовидная повязка
- б) спиральная повязка
- в) циркулярная повязка
- г) восьмиобразная повязка

14. Ограниченное скопление гноя в тканях – это:

- а) гематома
- б) абсцесс
- в) флегмона
- г) фурункул

15. Пациентам с гломерулонефритом рекомендовано ограничение:

- а) поваренной соли
- б) жидкости
- в) белков
- г) жиров

16. Характерным симптомом абсцесса является симптом:

- а) деформации
- б) крепитации
- в) флюктуации
- г) малигнизации

17. Сахарный диабет I типа:

- а) инсулинонезависимый

- б) инсулинозависимый
- в) диабет молодых
- г) диабет «толстых»

18. Клиническое проявление гипотиреоза:

- а) тахикардия
- б) брадикардия
- в) сухость кожи и слизистых
- г) повышенная влажность кожи и слизистых

19. Тактика фельдшера при отморожении заключается в наложении:

- а) теплоизолирующей повязки
- б) окклюзионной повязки
- в) давящей повязки
- г) мазевой повязки

20. Осложнения язвенной болезни:

- а) кровотечение
- б) перфорация
- в) гастрит
- г) рубцово-язвенный стеноз привратника

21. Симптомом сотрясения головного мозга является:

- а) анизокория
- б) ликворея из носа и ушей
- в) ретроградная амнезия
- г) длительная потеря сознания

22. Абсолютным признаком перелома кости является:

- а) патологическая подвижность
- б) пружинящая фиксация
- в) кровоподтеки
- г) деформация

23. Для лечения чесотки применяются:

- а) 33% серная мазь
- б) мазь «Флуцинар»
- в) шампунь «Сидхакс»
- г) параплюс

24. Безболевыми атипичными формами инфаркта миокарда:

- а) астматическая
- б) абдоминальная
- в) аритмическая
- г) периферическая

25. Основными симптомами травматического шока являются:

- а) снижение артериального давления (АД), частый и слабый пульс
- б) снижение артериального давления (АД), редкий пульс
- в) повышение артериального давления (АД), частый и слабый пульс
- г) повышение артериального давления (АД), редкий пульс

26.Тактика фельдшера при растяжении связок голеностопного сустава:

- а) новокаиновая блокада
- б) полуспиртовой компресс
- в) холод и фиксирующая повязка на сустав
- г) наложение гипсовой лонгеты

27.Тактика фельдшера здравпункта при открытом переломе:

- а) остановка кровотечения, наложение асептической повязки
- б) остановка кровотечения, асептическая повязка, наложение шины, госпитализация
- в) наложение шины
- г) наложение асептической повязки, обезболивание

28.К нагноительным заболеваниям легких относятся:

- а) бронхиальная астма
- б) абсцесс легких
- в) гангрена легких
- г) пневмония

29.При открытом пневмотораксе необходимо наложить повязку:

- а) асептическую спиртовую
- б) окклюзионную
- в) теплоизолирующую
- г) давящую

30.Для ревматического артрита характерно:

- а) преимущественное поражение мелких суставов
- б) преимущественное поражение крупных суставов
- в) оставляет стойкие изменения с развитием функциональной недостаточности
- г) проходит бесследно

31.Опоясывающая боль возникает при:

- а) аппендиците
- б) холецистите
- в) панкреатите
- г) перфоративной язве

32.Характер и локализация боли при остром холецистите:

- а) постоянная в правом подреберье
- б) постоянная в правой подвздошной области
- в) схваткообразная вокруг пупка
- г) «кинжальная» в эпигастральной области

33.Основным клиническим симптомом ущемлённой грыжи является:

- а) симптом Щёткина - Блюмберга
- б) невправляемость грыжи
- в) нарушение мочеиспускания
- г) положительный симптом «кашлевого толчка»

34.Достоверным симптомом перитонита является:

- а) симптом Щёткина - Блюмберга
- б) симптом Ортнера
- в) френикус - симптом

г) симптом Кохера

35.Основным клиническим симптомом кишечной непроходимости является:

- а) дискообразное напряжение брюшной стенки
- б) частое и болезненное мочеиспускание
- в) ладьевидный живот
- г) отсутствие стула более трех суток и неотхождение газов

36.При подозрении на дифтерию мазок из зева следует взять:

- а) с налета на миндалинах
- б) на границе фибринозной пленки и здоровой ткани миндалина
- в) со здоровой ткани миндалин
- г) с любого участка миндалина

37.Рекомендации пациентам с хроническим холециститом:

- а) ограничение жиров
- б) редкие приемы пищи
- в) частые приемы пищи в умеренных порциях
- г) ограничение углеводов

38.Для гипертензивного криза II вида характерно:

- а) преимущественное повышение диастолического давления
- б) преимущественное повышение систолического давления
- в) постепенное развитие криза с вестибулярным нарушением
- г) тахикардия

39.Прием, используемый для освобождения от инородных тел при обтурации:

- а) Селлика
- б) Вальсавы
- в) Хеймлиха
- г) Сафара

40.Полуспиртовой компресс ставится на:

- а) 1 – 2 часа
- б) 3 – 4 часа
- в) 6 – 8 часов
- г) 9 – 10 часов

41.Для приступа бронхиальной астмы характерны:

- а) учащение дыхания
- б) урежение дыхания
- в) свистящие дистанционные сухие хрипы
- г) «немое лёгкое»

42.Предраковым заболеванием молочной железы является:

- а) фиброма железы
- б) мастит
- в) мастопатия
- г) гемангиома молочной железы

43.Характерным клиническим признаком рака молочной железы является:

- а) цианоз кожи железы

- б) резкая боль при пальпации
- в) повышение температуры кожи железы
- г) втянутый сосок

44. Температура воды для заполнения грелки:

- а) 18 – 24 °
- б) 36 – 37 °
- в) 42 – 45 °
- г) 60 – 70 °

45. Для злокачественной опухоли характерно:

- а) чёткие границы, спаянность с тканями, отсутствие метастазов
- б) нечёткие границы, неспаянность с тканями, метастазирование
- в) отсутствие границ, спаянность с тканями, метастазирование
- г) отсутствие границ, неспаянность с тканями, отсутствие метастазов

46. Предраковым заболеванием желудка является:

- а) острый гастрит
- б) хронический анацидный гастрит
- в) дискинезия желчевыводящих путей
- г) острая язва желудка

47. Приступ почечной колики может спровоцировать:

- а) приём большого количества жидкости
- б) переедание
- в) хронический кашель
- г) бег, тряская езда

48. Симптомами ушиба почки являются:

- а) гематурия
- б) боль в пояснице
- в) повышение температуры тела
- г) гематома в области поясницы

49. При почечной колике в моче обнаруживают:

- а) белок
- б) лейкоциты
- в) цилиндры
- г) эритроциты

50. Правильное расположение активных электродов при регистрации ЭКГ:

- а) с красной маркировкой – на правую ногу
- б) с красной маркировкой – на левую ногу
- в) с зеленой маркировкой – на правую ногу
- г) с зеленой маркировкой – на левую ногу

51. Контроль качества предстерилизационной обработки включает контроль на:

- а) жировые загрязнения
- б) кровь
- в) моющие средства
- г) лекарственные загрязнения

52.Профессиональным заболеванием сварщиков является:

- а) вибрационная болезнь
- б) асбестоз
- в) катаракта
- г) эмфизема легких

53.Частота проведения генеральной уборки (в процедурных кабинетах) 1 раз в:

- а) семь дней
- б) десять дней
- в) двадцать один день
- г) месяц

54.Профилактику столбняка необходимо проводить:

- а) только при укушенных ранах
- б) при любых ранах
- в) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели контакт с почвой
- г) только при ожоговых ранах

55.Дезинфекции должны подвергаться:

- а) все медицинские изделия после использования
- б) только медицинские изделия, используемые в инвазивных процедурах
- в) только хирургические инструменты после использования
- г) только инструменты многоразового использования

56.Неотложная помощь при гипогликемической коме:

- а) сладкий чай
- б) 40% р-р глюкозы внутривенно
- в) 5% р-р глюкозы с 20 ЕД инсулина внутривенно
- г) адреналин

57.Препараты для первой помощи при анафилактическом шоке:

- а) адреналин
- б) анальгин
- в) преднизолон
- г) тавегил

58.Ранние признаки появления тугоухости:

- а) гипертония
- б) писк или звон в ушах при засыпании
- в) трудность восприятия шепотной речи
- г) снижение остроты слуха

59.Шум, оказывающий наиболее ранние и выраженные изменения в ухе:

- а) низкочастотный
- б) высокочастотный
- в) стабильный
- г) импульсный

60.Инфракрасное излучение может вызвать:

- а) катаракту
- б) блефароконъюнктивит
- в) тепловой удар

г) тепловое истощение

61.Ультрафиолетовое излучение может вызвать:

- а) катаракту
- б) блефароконъюнктивит
- в) фотодерматит
- г) фотоофтальмию

62.При значительных и длительных физических нагрузках диастолическое давление:

- а) увеличивается
- б) уменьшается
- в) не изменяется
- г) уравнивается с систолическим

63.При обильном потоотделении организм теряет витамины:

- а) А
- б) С
- в) В
- г) Д

64.Клинические проявления свинцовой колики:

- а) резкие схваткообразные боли в животе
- б) положительные симптомы раздражения брюшины
- в) запор, не уступающий действию слабительных
- г) повышение артериального давления (АД), брадикардия

65.Тактика фельдшера при ножевом ранении грудной клетки:

- а) удаление ранящего предмета из раны, обработка краев раны, наложение сухой асептической повязки
- б) фиксация ранящего предмета к краям раны, наложение сухой асептической повязки
- в) обработка раны, наложение окклюзионной повязки
- г) остановка кровотечения, наложение повязки

66.Наиболее ранние нарушения при вибрационной болезни:

- а) сенсорные
- б) спазм капилляров
- в) остеопороз
- г) тремор конечностей

67.Факторы, усугубляющие действие вибрации:

- а) шум
- б) низкие температуры
- в) статистическое напряжение
- г) повышенная влажность воздуха

68.Окраска кожных покровов при отравлении окисью углерода:

- а) синюшная
- б) ярко розовая или малинового цвета
- в) серая
- г) бледная

69. Тяжесть отравления окисью углерода определяется процентным содержанием в крови:

- а) метгемоглобина
- б) карбоксигемоглобина
- в) эритроцитов с базофильной зернистостью
- г) оксигемоглобина

70. Продукты, рекомендованные в качестве профилактического питания при повышенных концентрациях свинца:

- а) молоко
- б) масло
- в) кефир
- г) соки

71. При переломе костей предплечья шина накладывается:

- а) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча
- б) от лучезапястного до локтевого сустава
- в) на место перелома
- г) от кончиков пальцев до верхней трети плеча

72. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к:

- а) углу нижней челюсти
- б) ключице
- в) VI шейному позвонку
- г) I ребру

73. Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть:

- а) повернута на бок
- б) запрокинута назад
- в) согнута вперед
- г) в исходном положении

74. Профессиональное заболевание шахтеров:

- а) вибрационная болезнь
- б) эмфизема легких
- в) антракоз
- г) рак мочевого пузыря

75. ЭКГ-признаки, позволяющие заподозрить инфаркт миокарда:

- а) отсутствие зубца Р
- б) глубокий и широкий зубец Q
- в) подъем сегмента ST над изолинией
- г) низковольтная ЭКГ

76. Симптомы инфаркта миокарда:

- а) боль за грудиной сжимающего характера, купирующаяся нитроглицерином
- б) боль за грудиной в течение 4 - 5 дней, не купирующаяся нитроглицерином
- в) боль за грудиной более 30 минут, не купирующаяся нитроглицерином
- г) боль за грудиной менее 30 минут, возникающая ночью

77. Для крупозной пневмонии характерна мокрота:

- а) розовая пеннистая
- б) вязкая, стекловидная
- в) ржавая
- г) трехцветная

78. Неотложная помощь при почечной колике:

- а) нитрофураны
- б) спазмолитики
- в) тепло
- г) антибиотики

79. Объектом медицинского страхования является:

- а) страховой риск
- б) страховой полис
- в) страховой взнос
- г) застрахованный человек

80. Тип нарушения дыхания при черепно-мозговой травме:

- а) Куссмауля
- б) Чейн-Стокса
- в) Биота
- г) поверхностное

81. Ушная ликворея возникает при:

- а) травмах уха
- б) травмах носа
- в) сотрясении головного мозга
- г) переломе основания черепа

82. Кровотечение из уха при черепно-мозговой травме возникает при:

- а) сотрясении головного мозга
- б) переломе основания черепа
- в) травме уха
- г) внутричерепной гипертензии

83. Иррадиация болей при внематочной беременности:

- а) в поясницу
- б) в ногу
- в) в прямую кишку
- г) опоясывающие

84. При наличии паров хлора в атмосфере рекомендуется использовать ватно-марлевую повязку:

- а) смоченную в растворе уксуса
- б) смоченную в растворе спирта
- в) смоченную в растворе питьевой соды
- г) сухую

85. Четвертый грудной электрод (V₄) устанавливается в:

- а) третьем межреберье слева у края грудины
- б) четвертом межреберье слева у края грудины
- в) четвертом межреберье на срединно-ключевой линии

г) пятом межреберье на срединно-ключевой линии

86. Неврологические симптомы при ботулизме:

- а) дисфония, дисфагия, дизартрия
- б) светобоязнь, боль в глазных яблоках
- в) ассиметрия лица, девиация языка
- г) ригидность затылочных мышц

87. При проведении сердечно-легочной реанимации одним спасателем соотношение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к компрессии грудной клетки составляет:

- а) 1:5
- б) 2:5
- в) 2:15
- г) 2:30

88. При проведении сердечно-легочной реанимации двумя спасателями соотношение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к компрессии грудной клетки составляет:

- а) 1:5
- б) 2:5
- в) 2:15
- г) 2:30

89. Клиническими симптомами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки являются:

- а) боль в эпигастральной области через 30 минут после еды, тошнота, рвота, понос
- б) боль в эпигастральной области, отрыжка тухлым, обострение боли после приема жирной пищи
- в) голодные и ночные боли, уменьшающиеся после приёма пищи, сезонность обострений
- г) боль в правом подреберье, тошнота после еды, вздутие живота

90. Экстренной госпитализации подлежат пациенты с:

- а) впервые возникшей стенокардией
- б) стенокардией третьего функционального класса
- в) стенокардией четвертого функционального класса
- г) подозрением на инфаркт миокарда

91. Повышение температуры, озноб, боль в пояснице, дизурические явления характерны для:

- а) острого гломерулонефрита
- б) острого пиелонефрита
- в) хронического гломерулонефрита
- г) почечной колики

92. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при гипергликемической коме:

- а) инсулин, супрастин, экстренная госпитализация
- б) кордиамин, инсулин, экстренная госпитализация
- в) оксигенотерапия, инсулин, экстренная госпитализация
- г) оксигенотерапия, экстренная госпитализация

93. Признаками клинической смерти являются:

- а) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, окоченение
- б) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, реакции зрачка на свет

- в) отсутствие сознания, кровообращения, всех рефлексов, размягчение глазного яблока
- г) отсутствие сознания, кровообращения, дыхания, помутнение роговицы, окоченение

94. Наиболее ранними признаками биологической смерти являются:

- а) трупные пятна
- б) высыхание и помутнение роговицы
- в) трупное окоченение
- г) широкий зрачок, не реагирующий на свет

95. Положение пациента при переломе костей таза на:

- а) животе
- б) боку с приведенными к животу ногами
- в) спине в положении Волковича («лягушки»)
- г) спине с выпрямленными ногами

96. Симптомами острой левожелудочковой недостаточности являются:

- а) приступ удушья инспираторного типа
- б) приступ удушья экспираторного типа
- в) клочущее дыхание
- г) пенистая розовая мокрота

97. Тактика фельдшера при повреждении глаза:

- а) закапывание глазных антибактериальных капель, асептическая повязка, госпитализация
- б) асептическая повязка, анальгин, амбулаторное лечение
- в) анальгин, седуксен, госпитализация
- г) лидокаин, асептическая повязка, госпитализация

98. Неотложная помощь при отеке легких:

- а) положение полусидя
- б) наложение венозных жгутов на конечности
- в) ингаляция увлажненного кислорода
- г) ингаляция кислорода с парами спирта

99. Тактика фельдшера при инородных телах уха:

- а) госпитализация в оториноларингологическое отделение в любой ситуации
- б) амбулаторная консультация ЛОР - врача
- в) удаление инородного тела, консультация ЛОР - врача
- г) удаление инородного тела, антибиотики, обезболивающие

100. Тактика фельдшера при отрыве конечностей:

- а) остановка кровотечения, обезболивание, асептическая повязка, госпитализация
- б) асептическая повязка, обезболивание, наложение шины, госпитализация
- в) остановка кровотечения, ушивание раны, иммобилизация, госпитализация
- г) ушивание раны, обезболивание, госпитализация