

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1.Гормональнозависимый слой эндометрия матки:

- а) базальный
- б) функциональный
- в) компактный
- г) строма

2.Слизистая оболочка влагалища покрыта эпителием:

- а) цилиндрическим
- б) многослойным плоским
- в) железистым
- г) однослойным плоским

3.Менструальный цикл – это:

- а) сама менструация
- б) гормональные изменения, происходящие в яичниках
- в) фазы маточного цикла
- г) сложные биологические изменения в течение месяца во всех системах и органах женского организма

4.В регуляции менструального цикла особо важную роль играет:

- а) кора головного мозга
- б) гипофиз
- в) гипоталамус
- г) щитовидная железа

5.Бактериоскопический метод исследования – это взятие мазков на:

- а) атипию клеток
- б) чувствительность к антибиотикам
- в) микрофлору
- г) кандиды

6.Основной метод исследования в гинекологии с целью выявления патологии шейки матки:

- а) бимануальное влагалищное исследование
- б) осмотр шейки матки в зеркалах
- в) осмотр наружных половых органов
- г) микроскопический

7.Тестами функциональной диагностики выявляют:

- а) микрофлору влагалища
- б) функциональное состояние яичников
- в) количество половых гормонов в крови
- г) атипию клеток

8.Гистероскопия – это:

- а) осмотр полости матки оптическим прибором
- б) метод исследования полости матки с контрастом
- в) осмотр шейки матки оптическим прибором
- г) ультразвуковое исследование матки

9. Перед ультразвуковым исследованием (УЗИ) органов малого таза вагинальным датчиком необходимо:

- а) выпить жидкости и не опорожнять мочевого пузыря
- б) опорожнить мочевого пузыря
- в) ввести в мочевого пузыря контрастное вещество

10. Для проведения пробы Шиллера необходимо обработать шейку матки:

- а) этиловым спиртом
- б) вазелиновым маслом
- в) раствором Люголя
- г) раствором фуорцина

11. Перед расширенной кольпоскопией для «набухания» эпителия и визуализации сосудов шейку обрабатывают:

- а) 5% йодом
- б) 1% раствором уксусной кислоты
- в) 5% раствором перманганата калия
- г) раствором фуорцина

12. Базальную температуру измеряют ежедневно:

- а) после спринцевания влагалища
- б) утром в одно и тоже время, не вставая с постели
- в) после очистительной клизмы
- г) вечером в одно и тоже время перед сном

13. Симптом «папоротника» у здоровой женщины при 28-дневном менструальном цикле четко выражен на (день цикла):

- а) 5 - 6
- б) 10 - 12
- в) 14 - 15
- г) 20 - 22

14. Аменорея – это отсутствие менструации в течение:

- а) 2 - х месяцев
- б) 6 - ти месяцев
- в) 1 - го года
- г) 2 - х лет

15. Аменорея называется патологической:

- а) во время беременности
- б) при наличии опухоли гипофиза
- в) в периоде постменопаузы
- г) во время лактации

16. Метод исследования, позволяющий установить проходимость маточных труб:

- а) диагностическое выскабливание полости матки
- б) кольпоскопия
- в) гистеросальпингография
- г) гистероскопия

17.Для мазка второй степени чистоты влагалища характерно:

- а) влагалищные бациллы, клетки эпителия, единичные лейкоциты, слабнокислая среда
- б) влагалищных бацилл мало, много лейкоцитов, кокков и другой патогенной флоры, слабощелочная среда
- в) влагалищных бацилл много, клетки эпителия, кислая среда
- г) влагалищные бациллы, клетки эпителия, слабощелочная среда

18.К гиперменструальному синдрому относятся:

- а) редкие менструации
- б) аменорея
- в) короткие менструации
- г) дисфункциональные маточные кровотечения

19.Ановуляторные маточные кровотечения характеризуются:

- а) двухфазным менструальным циклом
- б) отсутствием овуляции и фазы секреции в эндометрии
- в) наличием овуляции
- г) повышением базальной температуры после овуляции

20.Основная причина воспалительных заболеваний органов малого таза:

- а) механический фактор
- б) термический фактор
- в) инфекционный агент
- г) химический фактор

21.Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена:

- а) золотистым стафилококком
- б) грамотрицательной флорой
- в) анаэробами
- г) ассоциацией микроорганизмов

22.При истинном абсцессе бартолиновой железы показано следующее лечение:

- а) мазовые повязки, промывание раны 3% перекисью водорода
- б) вскрытие абсцесса хирургическим путем, промывание раны 3% перекисью водорода
- в) промывание раны 3% перекисью водорода, дренирование раны

23.Для диагностики острого метроэндометрита необходимо применить:

- а) осмотр наружных половых органов
- б) бимануальное исследование
- в) осмотр шейки матки и влагалища зеркалами
- г) кольпоскопия

24.Выделяют следующие формы сальпингофорита:

- а) специфическую
- б) неспецифическую
- в) атипичную
- г) аллергическую

25. Осложнением, чаще всего возникающим при введении внутриматочной спирали (ВМС), считается:

- а) истмико - цервикальная недостаточность
- б) внематочная беременность
- в) привычный выкидыш
- г) острая инфекция
- д) тромбоз вен таза

26. Акушерский перитонит возникает после:

- а) родов
- б) раннего самопроизвольного выкидыша
- в) кесарева сечения
- г) искусственного аборта

27. Мазки на гонококк Нейсера берут:

- а) ложечкой Фолькмана из цервикального канала
- б) из заднего свода влагалища
- в) деревянным шпателем с боковой стенки влагалища
- г) из уретры

28. Гонококк поражает слизистые, выстланные эпителием:

- а) цилиндрическим
- б) многослойным плоским
- в) железистым
- г) однослойным плоским

29. Биологическая провокация гонорей – это:

- а) употребление острой пищи
- б) обработка наружного зева цервикального канала раствором Люголя
- в) введение гоновакцины
- г) индуктотермия с влагалищным электродом

30. Для лечения острой формы гонорей применяют:

- а) гормоны
- б) физиотерапевтические процедуры
- в) антибиотики
- г) спринцевание с антисептиками

31. Трихомоноз относится к:

- а) инфекциям, передающимся половым путём (ИППП)
- б) неспецифическим воспалительным заболеваниям женской половой сферы
- в) невоспалительное заболевание женской половой сферы

32. Трихомонады – это:

- а) вирусы
- б) грамм-положительные кокки
- в) простейшие жгутиковые
- г) кандиды

33. Иммуитет после перенесённого трихомоноза:

- а) создается
- б) не создается
- в) создается при постоянном половом партнере

34. Для молочницы влагалища характерны выделения:

- а) гнойные пенистые
- б) обильные слизистые
- в) творожистые
- г) необильные водянисто - слизистые

35. Хламидийная инфекция может:

- а) привести к бесплодию
- б) часто рецидивировать
- в) вызвать нарушение менструальной функции
- г) осложниться маточным кровотечением

36. Болезненная язвочка на малой половой губе - это скорее всего:

- а) генитальный герпес
- б) карбункул
- в) первичный сифилис
- г) псориаз

37. ВИЧ-инфекция передаётся через:

- а) грудное молоко
- б) кровь
- в) кухонную посуду
- г) сперму

38. Кисты яичников относятся к:

- а) истинным опухолям
- б) опухолевидным образованиям
- в) воспалительным заболеваниям
- г) обменным заболеваниям

39. Самое частое осложнение кисты яичника:

- а) кровоизлияние в полость кисты
- б) разрыв капсулы кисты
- в) перекрут «ножки» кисты
- г) бесплодие

40. Эндометриоидная киста яичника заполнена:

- а) густой тёмно-коричневой жидкостью
- б) гноем
- в) серозным содержимым
- г) эмбриональными зачатками

41. Дермоидная киста яичника развивается из:

- а) клеток фолликула
- б) зародышевой ткани
- в) белочной оболочки яичника
- г) надъяичниковых придатков

42. Во время беременности вирус простого герпеса (ВПГ-2) может вызвать:

- а) многоводие
- б) привычное невынашивание
- в) фетоплацентарную недостаточность
- г) уродство плода

43. Клиническим проявлением папилломавирусной инфекции (ПВИ) является наличие:

- а) эрозии на шейке матки
- б) генитальных бородавок (кондилом)
- в) «глазков» на шейке матки
- г) полипов на шейке матки

44. Диагноз плоских и инвертированных кондилом ставится на основании проведения:

- а) цитологического исследования
- б) расширенной кольпоскопии
- в) биопсии шейки матки с гистологией биоптата
- г) выскабливания цервикального канала

45. В лечении вирусных заболеваний гениталий необходимо применять:

- а) противовирусные средства
- б) антибиотики
- в) эубиотики
- г) витамины

46. При субмукозной форме миомы матки узел расположен в:

- а) полости матки
- б) мышечном слое
- в) периметрии

47. Кровотечение – это осложнение миомы:

- а) субсерозной
- б) интрамуральной
- в) субмукозной

48. Величина матки, являющаяся показанием к оперативному лечению миомы (в неделях):

- а) 4 - 6
- б) 5 - 7
- в) 8 - 9
- г) 12 и более

49. Операция, сохраняющая детородную функцию при миоме матки:

- а) надвлагалищная ампутация матки
- б) консервативная миомэктомия
- в) экстирпация матки
- г) высокая ампутация матки

50.Метод лечения кистомы яичника:

- а) лучевая терапия
- б) противовоспалительное лечение
- в) оперативное вмешательство
- г) химиотерапия

51.Подготовка операционного поля перед плановой операцией проводится:

- а) утром в день операции
- б) накануне вечером
- в) за 30 минут до операции
- г) дома накануне госпитализации

52.После экстренной операции для борьбы с парезом кишечника очистительную клизму ставят:

- а) через 6 - 8 часов
- б) в конце первых суток
- в) на третьи сутки
- г) на пятые сутки

53.Минимальный объём подготовки к экстренной операции – это:

- а) промывание желудка
- б) очистительная клизма
- в) подготовка операционного поля
- г) полная санобработка

54.Выбор объема минимальной подготовки к экстренной операции будет зависеть от:

- а) наличия или отсутствия кровотечения
- б) времени, прошедшего с начала заболевания
- в) состояния тяжести больной

55.Эндометриоз – это:

- а) заболевание воспалительного характера
- б) разрастание эндометриальноподобной ткани за пределами слизистой оболочки матки
- в) разновидность опухолей гениталий
- г) эндометриальные кисты

56.К внутреннему эндометриозу относится:

- а) эндометриоз тела матки (аденомиоз)
- б) ретроцервикальный эндометриоз
- в) «шоколадные» кисты яичников
- г) эндометриоз маточных труб

57.При эндометриозе шейки матки на ней будут видны:

- а) белые полосы различной длины
- б) «глазки» синебагрового цвета
- в) крошковидные включения белого цвета
- г) мелкие кисточки с серозным содержимым

58. Фоновые заболевания шейки матки - это:

- а) доброкачественные изменения на шейке матки, которые обязательно перерождаются в рак шейки
- б) предраковые заболевания
- в) доброкачественные заболевания, на фоне которых возможно развитие рака шейки
- г) воспалительные заболевания

59. Истинным предраковым заболеванием шейки матки является:

- а) эктропион шейки
- б) дисплазия шейки
- в) эндометриоз шейки
- г) истинная эрозия

60. Для экзофитной формы рака шейки матки характерно:

- а) разрастание ткани на шейке в виде «цветной капусты»
- б) бочкообразная форма шейки
- в) при осмотре шейка маленькая, атрофичная
- г) десквамация эпителия вокруг наружного зева

61. Ранний симптом рака шейки матки:

- а) боли внизу живота «грызущего» характера
- б) контактные кровотечения
- в) обильное кровотечение из половых путей
- г) аменорея

62. Наиболее точный метод диагностики рака шейки матки – это:

- а) расширенная кольпоскопия
- б) цитологическое исследование
- в) биопсия шейки с выскабливанием цервикального канала
- г) гистеросальпингография

63. Уточнить характер патологии шейки матки позволяет:

- а) лапароскопия
- б) кольпоскопия
- в) осмотр шейки в зеркалах
- г) гистеросальпингография

64. Выворот слизистой цервикального канала называется:

- а) эктропион
- б) лейкоплакия шейки
- в) эктопия
- г) истинная эрозия шейки

65. Эктопией шейки матки называется:

- а) разрастание ткани на шейке матки (плюс ткань)
- б) замещение многослойного плоского эпителия влагалищной части шейки матки цилиндрическим
- в) дефект эпителия
- г) выворот слизистой цервикального канала

66. Величина матки при 12-ти недельной беременности с:

- а) женский кулак
- б) куриное яйцо
- в) гусиное яйцо
- г) головку новорожденного

67. Самопроизвольный аборт – это прерывание беременности в сроке до (в неделях):

- а) 12
- б) 14
- в) 22
- г) 32

68. Указать правильную последовательность стадий самопроизвольного аборта:

- а) угрожающий аборт, аборт в «ходу», неполный выкидыш, начавшийся выкидыш, полный выкидыш
- б) угрожающий аборт, начавшийся выкидыш, аборт в «ходу», неполный выкидыш, полный выкидыш
- в) полный выкидыш, угрожающий аборт, аборт в «ходу», начавшийся выкидыш, неполный выкидыш

69. При неполном аборте в первую очередь проводят:

- а) гемостатическую терапию
- б) терапию, направленную на сокращение матки
- в) удаление остатков плодного яйца
- г) выскабливание стенок полости матки

70. Основным клиническим симптомом пузырного заноса является:

- а) кровотечение различной интенсивности
- б) боль разлитого характера внизу живота
- в) гнойные выделения из половых путей
- г) высокая температура

71. Злокачественная опухоль, в которую может переродиться пузырный занос:

- а) саркома матки
- б) хорионэпителиома (хорионкарцинома)
- в) рак матки
- г) опухоль Крукенберга

72. Основная причина развития трубной беременности:

- а) воспалительные процессы маточных труб
- б) кольпит
- в) эндоцервицит
- г) эндометриоз

73. Наиболее точный метод диагностики прогрессирующей трубной беременности:

- а) бимануальное исследование
- б) ультразвуковое исследование (УЗИ)
- в) лапароскопия
- г) гистероскопия

74.Для апоплексии яичника характерным является:

- а) задержка менструации
- б) приступ болей в середине менструального цикла
- в) повышение температуры до 38⁰ С
- г) наличие признаков беременности

75.При появлении мажущих кровянистых выделений из половых путей в постменопаузе прежде всего необходимо произвести:

- а) ультразвуковое исследование (УЗИ)
- б) кольпоскопию
- в) раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки
- г) гистероскопию

76.Для постменопаузы характерны проявления в костях:

- а) остеопороза
- б) остеомиелита
- в) остеомалации

77.Каждая женщина должна проходить профилактический осмотр у гинеколога 1 раз

в:

- а) 3 месяца
- б) 6 месяцев
- в) 1 год
- г) 3 года

78.Во время профосмотра обязательно берут мазки на:

- а) онкоцитологическое исследование
- б) посев
- в) гормональное исследование

79.При опущении стенок влагалища III степени с нарушением функции тазовых органов рекомендуется:

- а) ношение влагалищного кольца
- б) оперативное лечение
- в) лечебная физкультура для укрепления мышц тазового дна
- г) физиотерапия

80.Во время профилактического осмотра чаще других из доброкачественных заболеваний шейки матки диагностируют:

- а) эктопию
- б) лейкоплакию
- в) полип цервикального канала
- г) эритроплакию

81.В матке различают следующие основные отделы:

- а) тело
- б) шейку
- в) дно
- г) перешеек

82.К дополнительным методам обследования в гинекологии относятся:

- а) биопсия шейки матки
- б) бимануальное влагалищное исследование
- в) тесты функциональной диагностики
- г) пункция заднего свода влагалища

83.Кольпоскопия показана при заболеваниях:

- а) миома матки
- б) эрозия шейки матки
- в) лейкоплакия шейки
- г) эктопия шейки матки

84.Биопсия шейки матки проводится:

- а) в гинекологическом отделении больницы
- б) амбулаторно после кольпоскопии
- в) в женской консультации при наличии дневного стационара

85.В набор инструментов для диагностического выскабливания полости матки входят:

- а) конхотом
- б) пулевые шипцы
- в) кюретки
- г) скальпель
- д) расширители Гегара

86.Возбудители воспалительных заболеваний гениталий специфической этиологии:

- а) хламидии
- б) стрептококк
- в) вирусы
- г) дрожжеподобные грибы
- д) кишечная палочка

87.При туберкулёзе гениталий чаще поражаются:

- а) яичники
- б) маточные трубы
- в) влагалище
- г) эндометрий матки

88.К тестам функциональной диагностики – относятся:

- а) базальная температура
- б) R-снимок турецкого седла
- в) симптом «зрачка»
- г) симптом «папоротника»

89.Показания к оперативному лечению миомы матки:

- а) быстрый рост опухоли
- б) пременопаузальный период
- в) большие размеры опухоли (свыше 12 недель)
- г) подслизистое расположение узла

90. Гормонотерапия миомы матки показана при:

- а) небольшой величине опухоли
- б) субмукозной форме миомы
- в) отсутствии клинических проявлений
- г) увеличенной до 12 недель матке

91. Синдром «острого живота» в гинекологии может развиваться вследствие:

- а) острого бартолинита
- б) острого сальпингоофорита
- в) разрыва трубы при внематочной беременности
- г) перекрута «ножки» кисты яичника

92. При синдроме «острого живота» нельзя:

- а) вводить анальгетики и спазмолитики
- б) применять лед на живот
- в) кормить и поить больную
- г) ставить очистительную клизму

93. Для прервавшейся внематочной беременности по типу разрыва трубы характерны симптомы:

- а) периодические приступы болей внизу живота
- б) низкое АД, частый слабый пульс
- в) мажущие кровянистые выделения из половых путей
- г) «кинжальные» боли внизу живота

94. При прерывании внематочной беременности по типу трубного аборта развиваются клинические симптомы:

- а) характерные признаки беременности
- б) скудные кровянистые выделения из половых путей
- в) признаки внутреннего кровотечения
- г) схваткообразные боли внизу живота, чувство «дурноты»

95. Для перекрута «ножки» кисты характерна клиника:

- а) резкое снижение артериального давления (АД)
- б) тошнота, рвота
- в) жидкий стул
- г) живот умеренно вздут, чаще асимметрично

96. Внутривнутрибрюшное кровотечение возникает вследствие:

- а) неполного выкидыша
- б) апоплексии яичника
- в) рака шейки матки (распад опухоли)
- г) разрыва трубы при внематочной беременности

97. К современным методам контрацепции относятся:

- а) внутриматочная контрацепция
- б) химические методы
- в) гормональные препараты (КОК)
- г) барьерные (механические) методы
- д) хирургическая стерилизация

98. Внутриматочные спирали (ВМС) противопоказаны при:

- а) субмукозной форме миомы матки
- б) одном аборте без осложнений в анамнезе
- в) двурогой матке
- г) острым воспалении матки и /или придатков

99. Принцип действия комбинированных оральных контрацептивов (КОК):

- а) нарушают имплантацию оплодотворённой яйцеклетки
- б) уменьшают количество менструальной крови
- в) подавляют овуляцию
- г) обладают сперматотоксическим эффектом

100. Использование комбинированных оральных контрацептивов (КОК) противопоказано женщинам при:

- а) сахарном диабете с сосудистыми осложнениями
- б) эндометриозе
- в) тромбозе глубоких вен
- г) острым вирусном гепатите
- д) миоме матки