

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1. При запущенных злокачественных новообразованиях показана операция:

- а) радикальная
- б) паллиативная
- в) зональная
- г) экстренная

2. Доброкачественное образование:

- а) метастазирует в регионарные узлы
- б) метастазирует в отдаленные органы
- в) метастазирует в соседние органы
- г) не метастазирует

3. Основной метод лечения злокачественных новообразований:

- а) химиотерапия
- б) оперативный
- в) гормонотерапия
- г) физиотерапия

4. Злокачественное новообразование:

- а) не влияет на общее состояние
- б) растет медленно, имеет капсулу
- в) растет быстро, разрушая окружающие ткани
- г) не рецидивирует

5. «Атипичные» клетки характерны для:

- а) миомы
- б) фибромы
- в) саркомы
- г) ангиомы

6. При диагностике злокачественного новообразования прямой кишки прежде всего применяют:

- а) колоноскопию
- б) пальцевое исследование
- в) ирригоскопию
- г) ультразвуковое исследование

7. Исследование молочных желез при подозрении на новообразование начинают с:

- а) пункционной биопсии
- б) дуктографии
- в) маммографии
- г) пальпации

8. Для выявления «холодных» и «горячих» узлов в щитовидной железе применяют:

- а) сцинтиграфию
- б) рентгенографию
- в) пальпацию
- г) термографию

9. Злокачественное новообразование из соединительной ткани называется:

- а) фиброма
- б) киста
- в) саркома
- г) папиллома

10. Доброкачественное новообразование из соединительной ткани называется:

- а) фиброма
- б) киста
- в) саркома
- г) папиллома

11. При предрасположенности к раку характерно:

- а) изменение гормонального фона
- б) изменение иммунитета
- в) наличие предраковых заболеваний
- г) атипизм клеток органа
- д) изменение на генетическом уровне

12. Химиопрепараты, тормозящие деление раковых клеток называются:

- а) антиметаболиты
- б) цитостатики
- в) противоопухолевые антибиотики
- г) гормоны

13. Биопсия, при которой для исследования иссекают часть опухоли, называется:

- а) аспирационной
- б) пункционной
- в) инцизионной
- г) тотальной
- д) трепанобиопсия

14. К методам биопсии относятся:

- а) пункция толстой иглой с забором тканей
- б) исследование выделений
- в) эндоскопическое взятие кусочка тканей щипком
- г) исследование отпечатков
- д) иссечение кусочка тканей

15. Показания для срочной операции при доброкачественных новообразованиях:

- а) быстрый рост
- б) большие размеры
- в) локализация в местах, подверженных частому механическому воздействию
- г) локализация на лице
- д) появление осложнений

16. Врожденная опухоль, состоящая из отдельных органов или их частей называется:

- а) хондрома
- б) тератома
- в) фиброма
- г) саркома
- д) ангиома

17. Аденокарциномы злокачественные новообразования, происходящие из:

- а) соединительной ткани
- б) костной ткани
- в) хрящевой ткани
- г) эпителия
- д) эпителия с железистым компонентом

18. Для преинвазивного рака (carcinoma in situ) характерно:

- а) атипизм эпителия
- б) сохранность базальной мембраны
- в) инвазия в подслизистый слой
- г) неизменная структура эпителия
- д) отсутствие метастазов

19. Морфологические признаки раннего инвазивного рака:

- а) атипизм эпителия
- б) целостность клеточной мембраны
- в) неизменность структуры эпителия
- г) наличие отдаленных метастазов
- д) инвазия в подслизистый слой

20. Внутриэпителиальный неинвазивный рак обозначается символом:

- а) T₀
- б) T_x
- в) T_{is}
- г) T₁
- л) T₄

21. Доброкачественным считается новообразование:

- а) меланома
- б) фиброаденома
- в) аденокардиома
- г) лимфосаркома
- д) фибросаркома

22. Пациенты считаются излеченными от злокачественного новообразования если:

- а) опухоль удалена полностью
- б) при операции видимых метастазов не обнаружено
- в) прошло 5 лет после комплексного лечения
- г) прошло 10 лет после комплексного лечения
- д) жалоб не предъявляют

23. Под II стадией злокачественного заболевания следует понимать:

- а) локализованный процесс
- б) поражение регионарных лимфоузлов
- в) поражение близлежащих (органных) лимфоузлов
- г) наличие отдаленных метастазов

24.Абластик это система мероприятий, направленная на:

- а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции
- б) уничтожение раковых клеток в ране
- в) изоляцию больного от окружающих
- г) профилактику заболеваний среди медперсонала

25. Антибластика это комплекс мероприятий, направленных на:

- а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции
- б) уничтожение раковых клеток в ране
- в) изоляцию больного от окружающих
- г) профилактику заболеваний среди медперсонала

26.Методом морфологической верификации злокачественного новообразования считается:

- а) рентгеноскопия
- б) биопсия
- в) компьютерное исследование
- г) УЗИ
- д) термография

27.Длительная и интенсивная инсоляция может привести к возникновению новообразования:

- а) кожи
- б) легкого
- в) желудка
- г) крови

28.Карцинома in situ в классификации TNM соответствует стадии:

- а) IV
- б) III
- в) II
- г) I
- д) 0

29.Первичная диагностика рака на уровне общей лечебной сети предусматривает:

- а) установление наличия злокачественного новообразования
- б) морфологическую верификацию
- в) оценку стадии заболевания
- г) оценку распространенности процесса по системе TNM

30.Хронический болевой синдром у онкологических больных наиболее часто развивается при:

- а) метастазах в кости
- б) метастазах в мозг
- в) раке желудка
- г) лимфогранулематозе

31. Под термином «неoadъювантная химиотерапия» понимают:

- а) послеоперационную химиотерапию
- б) предоперационную химиотерапию
- в) профилактическую химиотерапию
- г) оценку эффективности послеоперационной химиотерапии по степени лекарственного патоморфоза

32. Под термином «адъювантная химиотерапия» понимают:

- а) послеоперационную химиотерапию
- б) предоперационную химиотерапию
- в) профилактическую химиотерапию
- г) оценку эффективности послеоперационной химиотерапии по степени лекарственного патоморфоза

33. К дистанционным методам лучевой терапии относятся:

- а) внутрисполостной
- б) внутритканевой
- в) аппликационный
- г) гамма-терапия

34. К контактными методам лучевой терапии относятся:

- а) рентгенотерапия
- б) гамма-терапия
- в) аппликационный
- г) нейронная терапия

35 «Онкологическая настороженность» это:

- а) подозрение на наличие рака, тщательное собирание анализа и обследование с целью выявления возможного онкологического заболевания
- б) санитарно-просветительская работа, первичная профилактика, формирование групп повышенного риска
- в) тщательный учет онкологических больных, вторичная профилактика
- г) привычка в трудных случаях диагностики думать о возможности злокачественного новообразования
- д) проведение всеобщей диспансеризации

36. Виды (пути) метастазирования:

- а) гематогенный
- б) иммуногематогенный
- в) имплантационный
- г) лимфогенный
- д) смешанный

37. Виды экспериментального лечения в онкологии:

- а) химиотерапия
- б) радиотерапия
- в) радиохирurgia
- г) нанотерапия
- д) криоабляция

38. Меланома это новообразование из:

- а) эпителия
- б) слизистой
- в) паренхимы
- г) невоидных клеток

39. Виды роста опухоли в зависимости от числа очагов:

- а) экзофитный
- б) уницентрический
- в) мультицентрический
- г) инфильтрирующий
- д) аппозиционный

40. Клинические симптомы ранней стадии злокачественного новообразования молочной железы:

- а) ограниченный узел в молочной железе
- б) узел в молочной железе
- в) выделение из соска
- г) втяжение кожи над очагом
- д) боли в молочной железе

41. Метастазирование злокачественного новообразования молочной железы в первую очередь происходит в лимфоузлы:

- а) паховые
- б) подключичные
- в) подмышечные
- г) шейные

42. Диагноз злокачественного новообразования считается установленным при:

- а) гистологическом исследовании
- б) клиническом осмотре
- в) радиоизотопном исследовании
- г) цитологическом исследовании

43. В понятие «комбинированный метод лечения новообразований» входит:

- а) радикальное хирургическое + лучевое по плану лечебного учреждения
- б) лучевое + хирургическое + лучевое в разных лечебных учреждениях
- в) дистанционная + аппликационная лучевая терапия
- г) лучевое + паллиативное хирургическое

44. В понятие «сочетанная терапия новообразований» входит:

- а) радикальное хирургическое + лучевое по плану лечебного учреждения
- б) лучевое + хирургическое + лучевое в разных лечебных учреждениях
- в) дистанционная + аппликационная лучевая терапия
- г) лучевое + паллиативное хирургическое

45. Основным первичным учетным документом онкологического диспансера считается:

- а) выписка из медицинской карты
- б) извещение о пациенте с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования
- в) контрольная карта диспансерного наблюдения
- г) протокол запущенности
- д) заключение районного онколога

46. Путь распространения опухоли считается практически не возможным:

- а) лимфатический
- б) по кровеносным сосудам
- в) контактный
- г) имплантационный от одного больного другому

47. В индустриальных странах главной причиной увеличения смертности от злокачественных новообразований считается:

- а) качество продуктов питания
- б) повышение профессиональных вредностей
- в) ухудшение экологической обстановки
- г) старение населения

48. Символ «N» применим для обозначения состояния:

- а) метастазирования
- б) опухоли мягких тканей
- в) отдаленных групп лимфатических узлов
- г) только регионарных лимфатических узлов

49. Массивное врастание опухоли в жизненно важный орган (органы) считается исключительно признаком стадии:

- а) III а
- б) III б
- в) IV а
- г) IV б

50. Стадия заболевания во многом определяет:

- а) выбор метода лечения
- б) прогноз
- в) объем операции
- г) эффективность лечения

51. Паллиативная помощь это:

- а) радикальное оперативное лечение
- б) реабилитация
- в) повышение качества жизни пациента с неизлечимой болезнью и членов его семьи
- г) комплексная терапия

52. Эвтаназия это:

- а) оказание клиничко-хирургической помощи пациенту с неизлечимой болезнью
- б) помощь в прекращении жизни пациента
- в) комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни и смерти пациента
- г) метод паллиативной помощи

53. Наиболее частым психологическим синдромом у пациентов с неизлечимой болезнью считается:

- а) нарушение личности
- б) нарушение психики
- в) тревога и депрессия
- г) эмоциональный ступор

54. Страх смерти является проблемой:

- а) духовной
- б) психологической
- в) социальной
- г) физической

55. Ятрогения это термин применим к:

- а) психическому заболеванию
- б) заболеванию с неблагоприятным прогнозом
- в) заболеванию, вызванному действиями медицинского работника
- г) разглашению врачебной тайны
- д) заболеванию, вызванному словами медицинского работника

56. Основной принцип обезболивания – это приема лекарств:

- а) по часам
- б) по требованию
- в) с повышением дозы
- г) с понижением дозы
- д) без учета индивидуальности

57. К побочным реакциям химиотерапии относятся:

- а) тошнота, рвота
- б) гипертермия
- в) агранулоцитоз
- г) нефротоксичность
- д) стоматит

58. Кардиотоксическое действие оказывают химиопрепараты:

- а) адриамицин
- б) винбластин
- в) карминомицин
- г) метатрексат
- д) рубомицин

59. Психическая стадия онкологического пациента в начальной стадии болезни:

- а) депрессия
- б) принятие
- в) протест
- г) отрицание

60. Основные задачи онкологического диспансера:

- а) проведение профилактических осмотров
- б) оказание квалифицированной стационарной, поликлинической, консультативной помощи
- в) координирование деятельности всех учреждений онкологической службы
- г) анализ причин поздней диагностики злокачественных новообразований

61. Основные признаки малигнизации пигментного невуса:

- а) изменение окраски, появление зернистости, медленный рост
- б) изменение окраски, периферический рост, зуд
- в) нагноение
- г) усиленный рост волос

62. Использованные ампулы и шприц-тюбики из-под наркотических средств и психотропных веществ хранятся в сейфе процедурного кабинета в течение:

- а) недели
- б) пяти дней
- в) трех дней
- г) суток

63. Смотровой кабинет относится к структурным подразделениям:

- а) врачебной амбулатории
- б) многопрофильной больницы
- в) онкологического диспансера
- г) территориальной поликлиники
- д) фельдшерско-акушерского пункта

64. Радикальные методы лечения злокачественных новообразований включают:

- а) полное излечение больного от злокачественного новообразования
- б) ликвидацию метастаз
- в) устранение симптомов злокачественного новообразования
- г) комплекс мероприятий, улучшающих качество жизни онкологического больного

65. При передозировке опиатов в качестве антагониста применяют:

- а) унитиол
- б) мепробамат
- в) налоксон
- г) гидрокортизон

66. Основные признаки злокачественных новообразований костей:

- а) гематома, боль, нарушение функции
- б) припухлость, кожный зуд, местное повышение температуры
- в) припухлость, боль, нарушение функции
- г) плотное образование, боль, усиливающаяся ночью, нарушение функции

67. Злокачественные новообразования хрящевой ткани:

- а) хондрома
- б) хондробластома
- в) хондросаркома
- г) хорионэпителиома
- д) тератома

68.К рентгенологическим исследованиям в онкологии относятся:

- а) ирригоскопия
- б) фиброгастроскопия
- в) колоноскопия
- г) холангиография
- д) цистоскопия

69.Для ранней диагностики злокачественного новообразования молочной железы применяются:

- а) флюорография
- б) акторальная резекция молочной железы
- в) маммография
- г) пункционная биопсия
- д) пальпация молочной железы

70.Наиболее частые регионы метастазирования злокачественного новообразования молочной железы:

- а) печень
- б) матка
- в) кости, лимфоузлы регионарные
- г) легкие, средостение

71.Мокроту для цитологического исследования необходимо доставить в лабораторию после сбора:

- а) сразу же
- б) не позднее 1-1,5 часа
- в) через 2 часа
- г) в течении суток

72.Метод исследования, позволяющий доказать морфологически (цитологически, гистологически) диагноз злокачественного новообразования желудка:

- а) рентгеноскопия желудка
- б) УЗИ
- в) радиоизотопное исследование
- г) фиброгастродуоденоскопия
- д) тепловидение

73.При злокачественном новообразовании кровь в кале появляется:

- а) перед дефекацией
- б) во время дефекации
- в) после дефекации
- г) без связи с дефекацией

74.Миома матки это:

- а) доброкачественное новообразование из гладкомышечных и соединительных тканей матки
- б) доброкачественное новообразование из соединительной ткани
- в) доброкачественное новообразование из мышечной ткани
- г) злокачественное новообразование из мышечной ткани

75.Первыми проявлениями лимфогранулематоза считаются увеличенными лимфоузлы:

- а) паховые
- б) медиастинальные
- в) забрюшинные
- г) шейные, надключичные

76.Наиболее частый симптом злокачественного новообразования простаты:

- а) боль в промежности, крестце
- б) дизурия
- в) микрогематурия
- г) нарушение акта дефекации

77.Осмотр и пальпацию молочной железы следует проводить в положении пациентки:

- а) стоя с опущенными руками
- б) сидя
- в) лежа
- г) стоя, положив руки на пояс или за голову

78.Постлучевые осложнения слизистой полости рта (радиомукозит) обрабатывают:

- а) 0,1% раствором йода
- б) содовым раствором
- в) раствором антисептика
- г) 6% раствором перекиси водорода

79.Во избежание патологических переломов при метастатических поражениях позвоночника под матрац пациента подкладывают:

- а) резиновый круг
- б) матерчатый валик
- в) металлические пластины
- г) деревянный щит

80.Обязательные условия при постановке лекарственной клизмы:

- а) температура 38° - 40°
- б) температура 35° - 37°
- в) объем 50-100 мл
- г) объем 1-1,5 л
- д) без предварительной очистительной клизмы
- е) после очистительной клизмы через 30-40 минут

81.Температура воды для постановки простой очистительной клизмы (в градусах по цельсию):

- а) 38° - 40°
- б) 25° - 30°
- в) 18° - 22°
- г) 15° - 17°

82.Газоотводную трубку ставят максимально на:

- а) 24 часа
- б) 12 часов
- в) 1 час
- г) 30 минут

83.Периодичность смены холодного компресса (в минутах):

- а) 20-30
- б) 10-15
- в) 7-9
- г) 2-3

84.Температура пищи, вводимой через стому (в градусах по цельсию):

- а) 60^0-65^0
- б) 35^0-45^0
- в) 25^0-30^0
- г) 18^0-22^0

85.Искусственное питание можно осуществлять через:

- а) гастростому
- б) зонд
- в) парентерально
- г) клизму
- д) рот
- е) илеостому
- ж) цистостому

86.Для предупреждения пролежней положение пациента в постели необходимо менять каждые:

- а) 30 минут
- б) 2 часа
- в) 4 часа
- г) сутки

87.Осложнения внутримышечных инъекций:

- а) воздушная эмболия
- б) гематома
- в) жировая эмболия
- г) инфильтрат
- д) тромбофлебит
- е) флебит
- ж) флегмона

88.Температура в прямой кишке по отношению к температуре, измеренной в подмышечной впадине:

- а) идентична
- б) ниже на 1^0
- в) выше на 10
- г) выше на 2^0

89. Мелена симптом кровотечения:

- а) геморроидального
- б) при язвенном колите
- в) желудочного
- г) из язвы 12-ти перстной кишки
- д) из варикозно расширенных вен пищевода

90. Подготовка пациента к колоноскопии включает в себя:

- а) низкокалорийную диету, слабительные средства, вечером накануне и за 2 часа до исследования
- б) диету с механическим и химическим щажением, вечером накануне и за 2 часа до исследования очистительную клизму
- в) низкокалорийную диету, слабительные средства, за 2 часа до исследования очистительную клизму
- г) сифонную клизму за час до исследования

91. Перед взятием кала для исследования на скрытую кровь пациентам рекомендуют за 3 дня до анализа исключить из диеты:

- а) свеклу
- б) препараты железа
- в) зелень
- г) кисло-молочные продукты
- д) гречневую кашу
- е) рисовую кашу

92. Анурия это понятие, означающее:

- а) отсутствие мочевыделения при полном мочевом пузыре
- б) острую задержку мочеиспускания
- в) прекращение поступления мочи в мочевой пузырь
- г) расстройство мочеиспускания

93. Нормальное содержание гемоглобина у женщин (в г/дл):

- а) 11-12
- б) 11,7-13,8
- в) 12-16
- г) 13-16

94. Положение пациента, которое он не в состоянии поменять называется:

- а) активное
- б) вынужденное
- в) дренажное
- г) пассивное

95. Температура тела от 37,0 до 37,9 градусов С называется:

- а) гиперпиретической
- б) пиретической
- в) субфебриальной
- г) фебриальной

96.К профилактике пролежней относится:

- а) протирание кожи камфорным спиртом
- б) рациональный водный режим
- в) рациональное питание
- г) своевременный прием лекарственных препаратов
- д) смена положения тела

97.Время подготовки кожи пациента перед плановой операцией (бритье):

- а) накануне вечером
- б) накануне утром
- в) за 2 часа до операции
- г) за 1 час до операции

98.Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают анализ мочи по:

- а) Аддис-Каковскому
- б) Зимницкому
- в) Нечипоренко
- г) Ребергу

99.Основным структурным звеном онкологической службы признано:

- а) НИИ онкологии
- б) онкологический диспансер
- в) смотровой кабинет территориальной поликлиники
- г) хоспис

100.При передозировке опиатов в качестве антагониста применяют:

- а) гидрокортизон
- б) кордиамин
- в) мексидол
- г) налоксон