

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

1.Основным симптомом отомикоза является:

- а) скудное гнойное выделение
- б) глухота
- в) зуд слухового прохода
- г) острая боль

2.Основным симптомом ларингоспазма является:

- а) дыхание Биота
- б) насморк
- в) стридорозное дыхание
- г) обильная мокрота

3.Наиболее частым осложнением ринита у грудных детей является:

- а) отит
- б) ангина
- в) гайморит
- г) плеврит

4.Интенсивная терапия при стридорозном дыхании предусматривает:

- а) восстановление свободной проходимости дыхательных путей
- б) введение сердечных гликозидов
- в) введение диуретиков
- г) бальнеотерапию

5.Мастоидит – это воспаление:

- а) носовой перегородки
- б) придаточных пазух носа
- в) сосцевидного отростка височной кости
- г) лобных пазух носа

6.Профилактика тяжёлой реакции на госпитализацию у ребёнка 1 года жизни включает:

- а) раздельное пребывание матери и ребёнка
- б) отвлечение игрушкой
- в) госпитализацию матери с ребёнком
- г) проведение терапевтической игры

7.Для проведения обратной ларингоскопии необходимо приготовить:

- а) гортанное зеркало
- б) ларингоскоп
- в) шпатель
- г) носовое зеркало

8. Введение лекарственных средств в барабанную полость грудного ребёнка предусматривает применение:

- а) шпателя
- б) ушной воронки
- в) шприца
- г) резиновой груши

9. Аденоиды I-II степени могут считаться физиологической нормой до возраста:

- а) 3 лет
- б) 7 лет
- в) 12 лет
- г) 16 лет

10. Предпочтительным положением грудного ребёнка в кроватке при наличии у него ринита является:

- а) на спине
- б) на животе
- в) на боку с возвышенным изголовьем
- г) коленно-кистевое

11. Ингаляцию при вирусном крупе проводят раствором:

- а) с лекарственными травами
- б) с муколитиками
- в) с бронхолитиками
- г) со спазмолитиками

12. У грудного ребёнка при остром отите боль усиливается при:

- а) приёме пищи
- б) проведении туалета носа
- в) физической нагрузке
- г) надавливании на козелок

13. Продувание слуховых труб для восстановления слуха производится при:

- а) воспалении среднего уха
- б) воспалении внутреннего уха
- в) аденоидите
- г) назофарингите

14.Симптомом, абсолютно характерным при попадании инородного тела в дыхательные пути, является:

- а) кашель
- б) выделения из носа
- в) кратковременная асфиксия
- г) рвота, слюнотечение

15.Сестринское вмешательство при ОРВИ для уменьшения симптомов интоксикации предполагает:

- а) оксигенотерапию
- б) обильное теплое питьё
- в) калорийную диету
- г) горчичное обёртывание

16.Предпочтительным положением больного после трахеотомии является:

- а) лежа на спине
- б) лежа на боку
- в) сидячее
- г) полусидячее

17.Подсчет дыхательных движений у грудного ребёнка оптимально проводить:

- а) после сна
- б) после кормления
- в) при пеленании
- г) во время сна

18.К симптомам вирусного крупа относится:

- а) влажный кашель
- б) сухой «лающий» кашель
- в) экспираторная одышка
- г) дыхание Куссмауля

19.Неблагоприятным симптомом отека Квинке является:

- а) лихорадка
- б) отёк гортани
- в) головная боль
- г) влажный кашель

20. Сестринское вмешательство при сухом кашле на фоне ОРВИ

предполагает:

- а) постуральный дренаж
- б) прием мукалтина
- в) горчичное обёртывание
- г) паровую ингаляцию

21. Температура капель при закапывании в ухо (в градусах по Цельсию):

- а) 20-22
- б) 24-30
- в) 37-38
- г) 42-45

22. Наиболее часто возникающим осложнением при ОРВИ является:

- а) синусит
- б) гломерулонефрит
- в) тугоухость
- г) сфеноидит

23. Сестринский процесс при аллергическом рините предусматривает:

- а) соблюдение гипоаллергической диеты
- б) применение антигистаминных препаратов
- в) проведение ароматерапии
- г) прием противовирусных препаратов

24. Сестринский процесс при ОРВИ предполагает:

- а) постельный режим, смену белья, теплое питье
- б) измерение диуреза, артериального давления (АД)
- в) прием противовирусных препаратов
- г) повышение калорийности пищевого рациона

25. Механизмом передачи ротавирусной инфекции является:

- а) трансмиссивный
- б) парэнтеральный
- в) трансплацентарный
- г) фекально-оральный

26. Осложнением вирусного гепатита С является:

- а) дисбактериоз
- б) цирроз печени
- в) гломерулонефрит
- г) сплениит

27. Приступообразный спазматический кашель характерен для:

- а) вирусного крупа
- б) дифтерийного крупа
- в) коклюша
- г) кори

28. Мазки из зева и носа на ВЛ берут:

- а) до завтрака, не допуская обработки ротовой полости
- б) до завтрака, обработав ротовую полость
- в) после завтрака и чистки зубов
- г) в любое время суток, независимо от приема пищи

29. Туалет носа грудному ребёнку проводят:

- а) ватными жгутиками
- б) ватными палочками
- в) марлевой турундой
- г) ватными шариками и пинцетом

30. Сестринское вмешательство осуществляется на этапе:

- а) сбора информации
- б) планирования сестринского ухода
- в) реализации плана
- г) оценки эффективности ухода

31. При кровотечении из уха до осмотра врача необходимо:

- а) почистить ухо ватным тампоном
- б) закапать капли в ухо
- в) ввести стерильный тампон в слуховой проход
- г) промыть ухо с раствором перманганата калия

32. Клиническими симптомами паратонзиллита являются:

- а) асимметрия глотки, лихорадка
- б) отсутствие интоксикации
- в) снижение саливации
- г) гипертензия

33. Для восстановления носового дыхания ребёнку через 3-4 недели после аденотомии необходимо порекомендовать:

- а) исключение физической нагрузки
- б) дыхательную гимнастику
- в) посещение бассейна
- г) проведение ароматерапии

34. Диспансерное наблюдение ребёнка с хроническим отитом проводится в течение:

- а) 1 года
- б) 3 лет
- в) 5 лет
- г) до передачи во взрослую поликлинику

35. Отсутствие речи у ребёнка в 3 года предполагает консультацию у:

- а) логопеда
- б) эндокринолога
- в) невролога и отоларинголога
- г) стоматолога

36. Диспансерное наблюдение у ЛОР-врача 4 раза в год показано при:

- а) хроническом эпитимпаните
- б) хроническом мезотимпаните
- в) рецидивирующим отите
- г) кохлеарномневрите

37. Репозиция костей носа после травмы показана до:

- а) 3 дней
- б) 7 дней
- в) 10 дней
- г) 1 месяца

38. Длительность применения сосудосуживающих капель в нос составляет:

- а) 3 дня
- б) 1 неделю
- в) 2 недели
- г) 1 месяц

39. Рекомендации ребёнку с ларингитом предусматривают:

- а) горячее питье
- б) голосовой режим
- в) постельный режим
- г) ограничение питья

40. Осложнением заглоточного абсцесса у детей раннего возраста является:

- а) сепсис, стеноз гортани
- б) снижение слуха
- в) отёк век
- г) диспептический синдром

41. После перенесённого инфекционного заболевания у ребёнка вырабатывается иммунитет:

- а) естественный, активный
- б) искусственный, пассивный
- в) естественный, пассивный
- г) искусственный, активный

42. Симптомом фурункула носа является:

- а) ограниченная инфильтрация, болезненность
- б) отсутствие интоксикации, гипотермия
- в) стридорозное дыхание
- г) снижение слуха, шум в ухе

43. Профилактика гриппа включает в себя:

- а) прием антибиотиков
- б) регулярное полоскание зева
- в) проведение ароматерапий
- г) сезонную вакцинопрофилактику

44. Подсчет частоты дыхательных движений у детей проводят за (время в секундах):

- а) 10
- б) 15
- в) 30
- г) 60

45. Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) рекомендуется хранить в:

- а) морозильном отделении холодильника
- б) холодильнике при температуре ниже 0°C
- в) холодильнике при температуре +2° +6°C
- г) тёмном месте при комнатной температуре

46. Сестринские рекомендации родителям ребёнка после перенесенной респираторной инфекции включают:

- а) щадящее закаливание
- б) длительное применение интерферона
- в) постоянное полоскание зева отваром шалфея
- г) обработку зева раствором Люголя

47. Путем передачи вирусного гепатита В является:

- а) воздушно-капельный
- б) пищевой
- в) водный
- г) трансплацентарный

48. Контрастные ножные ванны проводятся с возраста:

- а) 1 года
- б) 1,5-2 лет
- в) 3 лет
- г) 4 лет

49. Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции предусматривают:

- а) вакцинацию населения
- б) антибиотикотерапию
- в) санитарно-просветительную работу среди населения
- г) изоляцию больных и инфицированных

50. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке на фоне инъекции начинают с:

- а) прекращения введения аллергена
- б) придания дренажного положения пострадавшему
- в) введения адреналина
- г) применения пузыря со льдом на место инъекции

51. Искусственный активный иммунитет формируется в результате:

- а) перенесенной инфекционной болезни
- б) введения вакцины
- в) приема бактериофага
- г) введения иммуноглобулина

52. У детей раннего возраста (до 1 года) наблюдается следующий тип дыхания:

- а) диафрагмальный
- б) смешанный
- в) грудной
- г) брюшной

53. Острый фарингит – это воспалительный процесс слизистой:

- а) носовой полости
- б) оболочки гортани
- в) оболочки глотки
- г) оболочки конъюнктивы

54.Рекомендуемое положение ребёнка в постели при одышке:

- а) строго горизонтальное
- б) с приподнятым изголовьем
- в) с приподнятыми ногами
- г) лежа на боку

55.К анатомо-физиологическим особенностям органов дыхания новорожденного относятся:

- а) бронхи, трахея узкие
- б) голосовая щель широкая
- в) легкие эластичны, воздушны
- г) слизистая оболочка скудно васкуляризирована

56.Причиной проникновения инфекции из носоглотки в среднее ухо является:

- а) отсутствие нижнего носового хода
- б) недостаточное развитие придаточных пазух носа
- в) короткие и широкие евстахиевы трубы
- г) узкие носовые ходы

57.Сестринские рекомендации при влажном кашле включают:

- а) постуральный дренаж
- б) прием коделака
- в) паровые ингаляции
- г) оксигенотерапию

58.Развитию острого стенозирующего ларинготрахеита способствует:

- а) гиперсекреция бронхиального дерева
- б) отёк подсвязочного пространства
- в) спазм гладкой мускулатуры бронхов
- г) слабый кашлевой толчок

59.Симптомом аденовирусной инфекции является:

- а) атрофический фарингит
- б) гингивит
- в) глоссит
- г) конъюнктивит

60.Первая медицинская помощь при вирусном крупе предусматривает:

- а) проведение паровых ингаляций
- б) введение супрастина
- в) горчичное обёртывание
- г) проведение оксигенотерапии

61.Тактика сестринского вмешательства при носовом кровотечении включает:

- а) запрокидывание головы ребёнка назад
- б) прикладывание тепла на область переносицы
- в) наклон головы ребёнка вперед
- г) проведение задней тампонады носа

62.Симптомом, характерным для гайморита является:

- а) головная боль
- б) обострение обоняния
- в) полидипсия
- г) эрикоз

63.В возрасте 10 лет ребёнок I группы здоровья должен быть осмотрен:

- а) дерматологом
- б) аллергологом
- в) отоларингологом
- г) гастроэнтерологом

64.Целью сестринского процесса является:

- а) оценка тяжести заболевания
- б) установление причины заболевания
- в) удовлетворение основных потребностей пациента
- г) осуществление очередности лечебных мероприятий

65.Профилактические прививки после обострения хронического отита проводятся через:

- а) 3 дня
- б) 1 неделю
- в) 1 месяц
- г) 3 месяца

66.Лабиринтит - это воспаление:

- а) глотки
- б) наружного уха
- в) внутреннего уха
- г) гортани

67.Второй этап сестринского процесса включает в себя:

- а) сбор информации
- б) планирование сестринского процесса
- в) определение сестринских проблем
- г) оценку результатов

68. Заглочный абсцесс чаще развивается в возрастном периоде:

- а) преддошкольном
- б) младшем школьном
- в) пубертатном
- г) юношеском

69. Определение проблем пациента, возникающих в связи с заболеванием, это этап сестринского процесса:

- а) второй
- б) первый
- в) третий
- г) четвертый

70. Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем пациента - это этап сестринского процесса:

- а) первый
- б) второй
- в) третий
- г) четвертый

71. После удаления небных миндалин на диспансерном учете дети находятся в течение:

- а) 1 месяца
- б) 6 месяцев
- в) 1 года
- г) 5 лет

72. Порог слышимости при лёгкой степени тугоухости составляет (в децибелах):

- а) не более 50
- б) 60
- в) 70-80
- г) свыше 80

73. Сфеноидит начинается с поражения пазухи:

- а) верхнечелюстной
- б) клиновидной
- в) решетчатого лабиринта
- г) лобной

74.Одностороннее поражение слухового нерва возникает при:

- а) скарлатине
- б) кори
- в) эпидемическом паротите
- г) ветряной оспе

75.При взятии мазка из уха при гнойном отите необходимо:

- а) провести туалет наружного слухового прохода
- б) взять как можно больше гноя
- в) предварительно закапать капли в ухо
- г) предварительно пролечить антибиотиками