

**Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.**

**1. Основная цель сестринского процесса:**

- а) лечение пациентов
- б) сбор информации о состоянии здоровья пациента
- в) обучение пациентов
- г) достижение гармонического состояния пациента с миром и самим собой

**2. Внутриутробный период длится (в неделях):**

- а) 36-40
- б) 40-42
- в) 37-42
- г) 38-40

**3. Средняя масса тела доношенного новорожденного ребёнка (в граммах):**

- а) 2500-3000
- б) 3800-4000
- в) 3200-3500
- г) 2800-3000

**4. Первое прикладывание новорожденного к груди матери:**

- а) сразу после рождения
- б) через 1 час после рождения
- в) через 6 часов после рождения
- г) через 3 часа после рождения

**5. Период новорожденности длится (в днях):**

- а) 60
- б) 28
- в) 7
- г) 40

**6. Туалет глаз при гнойном конъюнктивите у новорожденного ребёнка проводится:**

- а) раствором борной кислоты
- б) раствором сульфацила натрия
- в) раствором левомицетина
- г) стерильной водой

**7. Для обработки пупочной ранки применяют:**

- а) 2% раствор бикарбоната натрия
- б) 3% раствор пероксида водорода
- в) 5% раствор йода
- г) 0,9% раствор хлорида натрия

**8. Функциональный признак недоношенности:**

- а) кости черепа плотные
- б) отсутствие сосательного и глотательного рефлексов
- в) мягкие ушные раковины
- г) отсутствие первородной смазки

**9.Естественное вскармливание – это вскармливание:**

- а) грудным молоком и введение прикормов с 5-6 месяцев жизни
- б) молочными смесями и прикормами
- в) грудным молоком и молочными смесями
- г) молочными смесями и соками

**10.В качестве первого блюда прикорма здоровому ребёнку медицинская сестра порекомендует:**

- а) фруктовое пюре
- б) творог
- в) соки
- г) овощное пюре

**11.К факторам развития сепсиса у новорожденных детей относятся:**

- а) гемолитическая болезнь новорожденных
- б) везикулопустулез, омфалит
- в) перелом ключицы, вывих бедра
- г) болезнь Дауна, галактоземия

**12.Причины развития рахита:**

- а) дефицит витамина Д, быстрый рост ребёнка на первом году жизни
- б) дефицит железа
- в) естественное вскармливание
- г) длительные прогулки

**13.В начальном периоде рахита медицинская сестра выявит:**

- а) деформацию костей
- б) беспокойство, облысение затылка, потливость
- в) повышение мышечного тонуса
- г) отставание в физическом развитии

**14.У ребёнка с атопическим дерматитом следует исключить из питания:**

- а) клубнику, куриный бульон, рыбу
- б) капусту, кабачки
- в) отварную говядину
- г) зеленые яблоки, белую смородину

**15.Сестринский процесс при атопическом дерматите:**

- а) прием антигистаминных препаратов
- б) назначение лечебных ванн
- в) ведение пищевого дневника
- г) назначение мазей, болтушек

**16.Симптомы железодефицитной анемии:**

- а) сухость кожи, румянец на щеках
- б) костные деформации
- в) снижение кальция в сыворотке крови
- г) бледность кожи, снижение гемоглобина

**17. Медицинская сестра порекомендует вводить следующие продукты ребёнку с анемией:**

- а) творог, молоко козье
- б) рисовую кашу, печенье
- в) мясо, гречневую кашу, соки
- г) картофельное пюре, манную кашу

**18. Осложнениями острой респираторной вирусной инфекции могут быть:**

- а) отит, пневмония
- б) туберкулез
- в) токсоплазмоз
- г) гастродуоденит

**19. К симптомам дыхательной недостаточности относятся:**

- а) цианоз, одышка
- б) влажный кашель
- в) отказ от пищи
- г) спазматический кашель

**20. Независимое сестринское вмешательство при пневмонии:**

- а) измерение диуреза
- б) ограничение питья
- в) контроль за дыханием
- г) назначение диеты № 9

**21. Для приступа бронхиальной астмы характерно:**

- а) одышка на выдохе, свистящие хрипы
- б) судороги, вынужденное положение
- в) кашель, мокрота с прожилками крови
- г) инспираторная одышка

**22. Туберкулез вызывают:**

- а) вирусы
- б) риккетсии
- в) эшерихии
- г) микобактерии Коха

**23. Вакцину БЦЖ вводят:**

- а) подкожно
- б) внутрикожно
- в) внутримышечно
- г) per os

**24. Ревакцинацию БЦЖ проводят детям:**

- а) всем 1 раз в 7 лет
- б) туберкулиноположительным
- в) туберкулиноотрицательным в 7 лет и в 14 лет
- г) всем 1 раз в 14 лет

**25.Проба Манту проводится туберкулином:**

- а) 0,1 мл внутрикожно
- б) 0,1 мл подкожно
- в) 0,2 мл подкожно
- г) 0,2 мл внутрикожно

**26.Учет пробы Манту проводится через:**

- а) 96 часов
- б) 72 часа
- в) 24 часа
- г) неделю

**27.Хронический гастродуоденит чаще возникает в возрасте:**

- а) дошкольном
- б) грудном
- в) преддошкольном
- г) школьном

**28.Причины развития хронического гастродуоденита:**

- а) строгое соблюдение диеты с раннего возраста
- б) смешанное вскармливание в грудном возрасте
- в) заражение хеликобактерной инфекцией
- г) железодефицитная анемия в анамнезе

**29.Энтеробиоз вызывается заражением:**

- а) трихинеллами
- б) власоглавом
- в) острицами
- г) эхинококком

**30.Основными симптомами энтеробиоза являются:**

- а) зуд в области ануса, беспокойный сон, боли в животе
- б) диарея, боли в животе
- в) головная боль, головокружение
- г) тенезмы, «ректальные плевки»

**31.Диагностика аскаридоза основывается на обнаружении:**

- а) яиц в перианальном соскобе
- б) яиц аскарид в кале
- в) яиц аскарид в мокроте
- г) личинок в желудочном содержимом

**32.Профилактика гельминтозов предусматривает:**

- а) обследования на яйца гельминтов
- б) дуоденальное зондирование 1 раз в год
- в) применение немозола
- г) биохимическое исследование крови 1 раз в год

**33.Причинами развития сахарного диабета являются:**

- а) недоедание
- б) наследственность, переедание
- в) занятия спортом
- г) анемия в анамнезе

**34.Клинические проявления сахарного диабета:**

- а) сухость и зуд кожи, жажда, снижение иммунитета
- б) сухость кожи, снижение гемоглобина
- в) тремор конечностей, тахикардия
- г) сухость кожи, экзофтальм

**35.Особенности введения инсулина:**

- а) подкожно в область живота
- б) внутримышечно в переднюю поверхность бедра
- в) внутрикожно в плечо
- г) только внутривенно

**36.Ревматизм развивается чаще после перенесенных заболеваний:**

- а) пневмонии
- б) ангины, скарлатины
- в) сальмонеллеза
- г) вирусного гепатита

**37.Ревматическое поражение нервной системы называется:**

- а) хондродистрофией
- б) арахноидитом
- в) хореей
- г) гидроцефалией

**38.Сестринские рекомендации ребёнку с вегетососудистой дистонией:**

- а) соблюдение режима труда, отдыха, питания
- б) регулярное измерение температуры тела
- в) измерение суточного водного баланса
- г) освобождение от физкультуры

**39.Факторы риска развития цистита:**

- а) аномалии строения почек
- б) переохлаждение
- в) асфиксией в родах
- г) наличие пороков развития пищеварительного тракта

**40.Сестринский процесс при пиелонефрите:**

- а) ограничение питьевого режима
- б) назначение фитотерапии
- в) рекомендовать занятия спортом
- г) увеличение питьевой нагрузки, соблюдение личной гигиены

**41.Симптомы, характерные при гломерулонефрите:**

- а) полиурия
- б) глюкозурия
- в) отеки, олигурия
- г) артериальная гипотония

**42.Ребёнка необходимо подмыть при взятии мочи на анализ:**

- а) по Зимницкому
- б) по Нечипоренко
- в) на сахар
- г) на диастазу

**43.Краснуха, возникшая в первом триместре беременности, опасна развитием:**

- а) пиелонефрита у беременной
- б) сахарного диабета у беременной
- в) врожденных пороков у плода
- г) бронхиальной астмы у беременной

**44.Основные симптомы краснухи:**

- а) мелкопятнистая сыпь, увеличение затылочных лимфоузлов
- б) геморрагическая сыпь, ангина
- в) спазматический кашель, конъюнктивит
- г) крупно-пятнистая сыпь, пигментация

**45.Возбудитель кори:**

- а) палочка Борде-Жангу
- б) менингококк
- в) вирус
- г) стрептококк

**46.Сестринский процесс при кори включает:**

- а) постельный режим, ограничение питья
- б) изоляцию, теплое щелочное питье, туалет носа, глаз
- в) изоляцию, еженедельный контроль диуреза
- г) обработку сыпи 5% раствором перманганата калия

**47.Варианты течения эпидемического паротита:**

- а) лимфаденит
- б) паротит, отит
- в) проктит
- г) паротит, панкреатит, орхит, менингит

**48.Специфическая профилактика эпидемического паротита:**

- а) вакцинация в 1,5 года, ревакцинация в 7 лет
- б) вакцинация в 1 год, ревакцинация в 6 лет
- в) вакцинация в 1 год
- г) вакцинация в 6 лет

**49.Профилактика ветряной оспы:**

- а) изоляция больного, карантин в очаге 21 день
- б) бактериологическое исследование кала
- в) карантин в очаге 10 дней, без изоляции больного
- г) вакцинация в 3 года

**50.Истинный круп развивается при:**

- а) кори
- б) ОРВИ
- в) дифтерии
- г) коклюше

**51.Основные симптомы скарлатины:**

- а) отеки, гипертермия
- б) ангина, мелкоточечная сыпь, интоксикация
- в) афония, интоксикация
- г) эксикоз, интоксикация

**52.Для профилактики дифтерии и коклюша применяют вакцину:**

- а) АДС
- б) ОПВ
- в) АКДС
- г) БЦЖ

**53.Карантин при гепатите А устанавливается на (в днях):**

- а) 35
- б) 21
- в) 10
- г) 14

**54.Жидкий стул с примесью слизи и крови характерен при:**

- а) эшерихиозе
- б) холере
- в) сальмонеллезе
- г) шигеллезе

**55.Мероприятия в очаге инфекции при кишечной инфекции:**

- а) карантин 7 дней, бакпосев кала у контактных
- б) карантин 21 день
- в) исследование крови на стерильность
- г) вакцинация

**56.Грудному ребёнку докорм назначают при:**

- а) естественном вскармливании
- б) смешанном вскармливании
- в) искусственном вскармливании
- г) всех видах вскармливания

**57. Контрольное кормление проводят для определения:**

- а) массы тела
- б) количества высосанного молока
- в) количества прикорм
- г) количества докорма

**58. Контрольное взвешивание проводят:**

- а) 2 раза в день
- б) 1 раз в день
- в) в течение одних суток
- г) в течение 2 суток

**59. Фруктовые соки дают ребёнку первого полугодия жизни:**

- а) перед кормлением грудью
- б) после кормления грудью
- в) между кормлениями грудью
- г) только на ночь

**60. Состояние родничков у глубоко недоношенных детей:**

- а) все закрыты
- б) открыт большой
- в) открыт большой и малый
- г) открыт большой, малый и боковые

**61. Размягчение костей черепа, уплощение затылка у ребёнка наблюдаются при:**

- а) менингите
- б) менингоэнцефалите
- в) рахите
- г) энцефалите

**62. Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы:**

- а) введение эуфиллина
- б) проведение отвлекающих процедур
- в) введение антибиотиков
- г) проведение оксигенотерапии

**63. Тактика медицинской сестры при стенозирующем ларинготрахеите вне лечебного учреждения:**

- а) направление в поликлинику
- б) срочная госпитализация
- в) проведение оксигенотерапии
- г) назначение физиотерапевтических процедур

**64. Из питания ребёнка с обострением язвенной болезни исключают:**

- а) мясной и рыбный бульоны
- б) молочные и слизистые супы
- в) молоко и творог
- г) сливочное масло



**65. Фактором риска развития желчнокаменной болезни у детей является:**

- а) низкокалорийное нерегулярное питание
- б) избыточное употребление молочных продуктов
- в) ожирение и сахарный диабет
- г) дискинезия желчевыводящих путей

**66. Гастроэзофагальный рефлюкс предполагает развитие:**

- а) пневмонии
- б) стоматита
- в) паратрофии
- г) эзофагита

**67. Дисфункция кишечника, диарея характерны для:**

- а) рахита
- б) анемии
- в) целиакии
- г) гипотиреоза

**68. Меры профилактики обострения хронического пиелонефрита:**

- а) контроль анализов мочи после любого заболевания
- б) профилактика стрессовых ситуаций
- в) антибактериальная терапия
- г) контроль анализа мочи раз в 3 месяца

**69. Неспецифическое осложнение сахарного диабета:**

- а) кандидоз
- б) липодистрофия
- в) пневмония
- г) стоматит

**70. Группа риска по развитию сахарного диабета:**

- а) перенесшие острый диффузный гломерулонефрит
- б) страдающие ожирением
- в) страдающие энурезом
- г) перенесшие пневмонию

**71. Причины гипогликемического состояния:**

- а) пропуск инъекции инсулина
- б) неадекватно высокая доза инсулина
- в) переедание
- г) поздняя диагностика сахарного диабета

**72. Экстренное извещение об инфекционном больном заполняют:**

- а) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь
- б) после консультации с врачом-инфекционистом
- в) после лабораторного подтверждения диагноза
- г) после консультации с врачом-инфекционистом и лабораторного подтверждения диагноза

**73. При подозрении на менингококковую инфекцию для выявления менингококка исследуют:**

- а) слизь из носа
- б) слизь из ротоглотки
- в) слизь из носоглотки
- г) кровь на стерильность

**74. Механизм передачи возбудителя кишечных инфекций:**

- а) парентеральный
- б) фекально-оральный
- в) аэрозольный
- г) трансмиссивный

**75. При пищевой токсикоинфекции типичным симптомом является:**

- а) наличие тенезмов
- б) частые мочеиспускания
- в) частая рвота
- г) болезненность сигмовидной кишки