

Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.

При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы:

- а Верхней прямой
- б Наружной прямой
- в Нижней прямой
- г Нижней косой

Противопоказания к проведению магнитно-резонансной томографии является:

- а Беременность
- б Повышенная чувствительность к природным магнитным полям
- в Установленный кардиостимулятор
- г металлические зубные имплантаты

Для уменьшения процессов свободно радикального окисления в раннем периоде черепно-мозговой травмы применяется:

- а а-токоферола ацетат
- б Дексаметазон
- в Фенобарбитал
- г Верно А и Б
- д Все выше перечисленное

В основу классификации полиневропатий положен следующий принцип:

- а Этиология заболевания
- б Особенности течения заболевания
- в Особенности клинической картины
- г Верно Б и В
- д Все выше перечисленное

Острый некротический энцефалит вызывают вирусы:

- а Коксаки
- б простого герпеса
- в Кори
- г Паротита

Характерным признаком тромбоза внутренней сонной артерии является:

- а Альтернирующий синдром Валенберга – Захарченко
- б Альтернирующий синдром Вебера (парез глазодвигательного нерва и пирамидный синдром)
- в Альтернирующий оптикопирамидный синдром
- г Сенсорная афазия
- д Все перечисленное

Наиболее частой причиной ортостатической гипотензии являются:

- а Передозировка гипотензивных препаратов
- б Диабетическая полиневропатия
- в Идиопатическая ортостатическая гипотензия
- г Заболевания сердца
- д Заболевания крови
- е Ничего из перечисленного

Основными задачами медицинской генетики является изучение:

- а Законов наследственности и изменчивости человеческого организма
- б Популяционной статистики наследственных заболеваний
- в Молекулярных и биохимических аспектов наследственности
- г Изменение наследственности под воздействием факторов окружающей среды
- д Всего перечисленного
- е Верно А и Б

Согласно современной классификации черепно - мозговой травмы не выделяют:

- а Ушиб головного мозга легкой степени
- б Сдавление головного мозга вследствие эпидуральной гематомы

- в Сотрясение головного мозга тяжелой степени
- г Сдавление головного мозга на фоне его ушиба

ЭЭГ - признаками поверхностной расположенной опухоли является регистрация:

- а б - волн в отведении с ограниченного участка
- б б - волн во всех полушарий отведениях
- в б - волн в симметричных участках обоих полушарий
- г Верно А и Б
- д Достоверных признаков не существует

Компьютерная томография мозга не показана, если у больного с поражением головного мозга:

- а Диагностирован инфаркт миокарда
- б Появятся признаки поражения ствола
- в Бессознательное состояние
- г Лучевая болезнь
- д Все перечисленное

Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются все перечисленные, кроме:

- а Недопущение снижение объемов медицинской и лекарственной помощи
- б Развитие многоканальности финансирования
- в Сохранение общественного сектора здравоохранения
- г Увеличение кадрового потенциала
- д Формирование правовой базы реформ отрасли

Мидриаз возникает при поражении:

- а Верхней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва
- б Нижней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва
- в Мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва
- г Среднего непарного ядра
- д Ядра медиального продольного пучка

Характерным для больных невралгией тройничного нерва являются жалобы:

- а На постоянные ноющие боли, захватывающие половину лица
- б На короткие пароксизмы интенсивной боли, провоцирующиеся легким прикосновением к лицу
- в На приступы нарастающей по интенсивности боли в области глаза, челюсти, зубов, сопровождающиеся усиленным слезо- и слюноотечением
- г На длительные боли в области орбиты, угла глаза, сопровождающиеся нарушением остроты зрения

В связи с меньшим влиянием на электролитный баланс для лечения отека мозга при тяжелой черепно-мозговой травме следует применять:

- а Гидрокортизон
- б Преднизалон
- в Дексаметазон
- г Кортизон

Фактором, определяющим поражение нервов при дифтерийной полиневропатии, является:

- а Инфекционный
- б Токсический
- в Сосудистый
- г Метаболический

д Все перечисленные

Лечение паротитного менингита включает все перечисленное, кроме:

- а Кортикостероидов
- б Дезоксирибонуклеазы
- в Трипсина
- г Аскорбиновой кислоты
- д Глицерина

Закупорку экстракраниального отдела позвоночной артерии от закупорки интраниального ее отдела отличает наличие:

- а Классических альтернирующих симптомов
- б Глазодвигательных расстройств
- в Двигательных и чувствительных нарушений
- г «Пятнистости» поражения ствола по длиннику
- д Вестибуломожжечковых нарушений

Поражение вегетативных волокон характерно для следующего варианта периферической невропатии:

- а Миелинопатии
- б Нейронопатии
- в Аксонопатии
- г Валлеровского перерождения
- д любого из перечисленного
- е ничего из перечисленного

Доминантный признак по закону Менделя проявится при скрещивании во втором поколении с частотой:

- а 1:1
- б 2:1
- в 3:1
- г 4:1
- д 5:1

Диффузное аксональное повреждение головного мозга при черепно-мозговой травме характеризуется:

- а Длительными коматозными состояниями с момента травмы
- б Развитием комы после « светлого» периода
- в Отсутствием потерей сознания
- г Кратковременной потерей сознания

Для опухоли премоторной области лобной доли характерны:

- а Гемипарез с преобладанием в ноге
- б Моторная афазия
- в Адверсивные эпилептические припадки
- г Атрофия зрительного нерва на стороне опухоли
- д Все перечисленное

Ранними формами неврологических осложнений при заболевании печени являются:

- а Экстрапирамидные нарушения
- б Нарушения психики
- в Неврастенические синдромы
- г Полиневропатия

Медицинская этика - это:

- а Специфическое проявление общей этики в деятельности врача
- б Наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, совести и достоинства медицинских работников
- в Наука, помогающая выработать у врача способность к нравственной ориентации в сложных ситуациях требующих высоких морально-деловых и социальных качеств
- г Верно все перечисленное

Если верхняя граница проводниковых расстройств болевой чувствительности определяется уровне дерматома T10 , поражение спинного мозга локализуется на уровне сегмента:

- а Т6 или Т7
- б Т8 или Т9
- в Т9 или Т10
- г Т10 или Т11

Компьютерная томография более информативна, чем магнитно-резонансная томография, при следующей патологии:

- а Рассеянном склерозе
- б Гидроцефалии
- в Гепатолентикулярной дегенерации
- г Внутримозговой кальцификации

Для коррекции падения сердечной деятельности при острой тяжелой черепно- мозговой травме целесообразно назначение:

- а Адреналина
- б Норадреналина
- в Мезатона
- г Дофамина

Синдром полиневропатии чаще всего проявляется:

- а Слабостью проксимальных отделов конечностей
- б Расстройством чувствительности в дистальных отделах конечностей
- в Вегетативными нарушениями в кистях или стопах
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

К симптомам, характерным для поражения левой передней мозговой артерии, относятся:

- а Нарушение психики
- б Преобладание пареза в ноге
- в Хватательный рефлекс
- г Апраксия левой руки

д Все перечисленное

Феномен денервационной гиперчувствительности характернее для поражения:

- а Преганглионарных симпатических нейронов
- б Постганглионарных симпатических нейронов
- в Преганглионарных парасимпатических нейронов
- г Постганглионарных парасимпатических нейронов
- д Верно А и Б
- е Верно Б и Г

Доминантный ген- это ген, действие которого:

- а Выявляется в гетерозиготном состоянии
- б Выявляется в гомозиготном состоянии
- в Выявляется в гетеро- и гомозиготном состоянии
- г Неверно все из перечисленных

К открытой черепно- мозговой травме относится травма:

- а С ушибленной раной мягких тканей без повреждения апоневроза
- б С повреждением апоневроза
- в С переломом костей свода черепа
- г С переломом костей основания черепа без ликвореи

Ремиттирующее течение первичных опухолей спинного мозга определяется наиболее часто при локализации:

- а В поясничном отделе
- б В шейном отделе
- в В области конского хвоста
- г В грудном отделе

Решающее значение в диагностики менингита имеет:

- а Острое начало заболевания с повышением температуры
- б Острое начало заболевания с менингеальным синдромом
- в Изменение спинномозговой жидкости
- г Присоединение инфекционно-токсического шока

Медицинская деонтология- это:

- а Самостоятельная наука о долге медицинских работников
- б Прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики

При центральном параличе не наблюдается:

- а Гипотрофия мышц
- б Повышения сухожильных рефлексов
- в Нарушения функции тазовых органов
- г Нарушения электровозбудимости нервов и мышц

Содержание белка в цереброспинальной жидкости в норме колеблется в пределах:

- а 0,15-0,45 мг/л
- б 0,15-0,45 мг/мл
- в 0,15-0,45 ммоль/л
- г 0,15-0,45 г/л

Наиболее эффективными корректорами гиперметаболизма при тяжелой черепно-мозговой травме являются:

- а Ингибиторы МАО
- б Трициклические антидепрессанты
- в Нейролептики
- г Барбитураты
- д Все перечисленные препараты

Для алкогольной полиневропатии характерно:

- а Преимущественное поражение нижних конечностей

- б Преимущественное поражение верхних конечностей
- в Боли в голених и стопах
- г Боли в предплечьях кистях
- д Верно А и В
- е Верно Б и Г

К редким синдромам энцефалита Экономо относятся:

- а Глазодвигательные расстройства
- б Патологические стопные знаки
- в Нарушение сна
- г Вегетативные расстройства

Для поражения основного ствола правой средней мозговой артерии характерно наличие:

- а Левосторонней гемианестезии
- б Левосторонней гемиплегии
- в Анозогнозии
- г Всего перечисленного

Для выявления феномена гиперчувствительности при денервации зрачка следует закапать в глаз:

- а 1% раствор адреналина
- б 0,1% раствор адреналина
- в 12,5% раствор пилокарпина
- г 1,25% раствор пилокарпина
- д Верно А и В
- е Верно Б и Г

Генотип организма представляет собой систему взаимодействия генов, при котором наследственные признаки формируются путем участия:

- а Одного гена в определении одного признака
- б Одного гена в определении многих признаков
- в Многих генов в определении одного признака
- г Верно А и В
- д Верны все перечисленные

Сострясение головного мозга в сочетании с повреждением мягких тканей относится к черепно-мозговой травме:

- а Легкой открытой
- б Легкой закрытой
- в Открытой средней тяжести
- г Закрытой средней тяжести

Ремиттирующее течение спинальных опухолей наиболее часто наблюдается:

- а При ангиоретикулемах
- б При глиомах
- в При менингиомах
- г При невриномах
- д При эпендимоммах

Потеря сознания при синкопальном состоянии обычно длится не более:

- а 10 с
- б 1 мин
- в 3 мин
- г 5 мин

В формировании общественного здоровья определяющую роль играют:

- а Генетические факторы
- б Природно-климатические факторы
- в Уровень и образ жизни населения
- г Уровень, качество и доступность медицинской помощи

Хореический гиперкинез возникает при поражении:

- а Палеостриатума
- б Неостриатума
- в Медиального бледного шара
- г Латерального бледного шара

Для не осложненного застойного диска зрительного нерва характерны:

- а Гиперемия, стертость границ диска
- б Раннее снижение зрительной функции

- в Сужение границ поля зрения
- г Верно А и Б
- д Верно А и В

Чтобы купировать психомоторное возбуждение при тяжелой черепно-мозговой травме, применяют:

- а Диазепам
- б Аминазин
- в Пропазин
- г Гексенал
- д Любой из перечисленных препаратов

Лекарственные полиневропатии чаще вызывают:

- а Цитостатики
- б Гипотензивные препараты
- в Противотуберкулезные средства
- г Верно А и В
- д Верно А и Б

Острый клещевой энцефалит характеризуется:

- а Пиком заболеваемости в осенне-зимний период
- б Отсутствием менингеального синдрома
- в Снижением внутричерепного давления
- г Вялыми парезами и параличами мышц плечевого пояса
- д Нейтрофильным цитозом в ликворе

Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие:

- а Гомонимной гемианопсии
- б Битемпоральной гемианопсии
- в Биназальной гемианопсии
- г Концентрического поля зрения

Феномен ортостатической гипотензии характеризуется снижением артериального давления в вертикальном положении:

- а Систолического – на 20 мм рт.ст. и более
- б Систолического – на 30 мм рт.ст. и более
- в Диастолического - на 20 мм рт.ст. и более
- г Верно все перечисленное
- д Верно Б и В

Пробандом называют:

- а Здорового носителя мутантного гена
- б Больного носителя мутантного гена
- в Здорового родителя больного с признаками наследственного заболевания
- г Ребенка, больного наследственным заболеванием

Для внутричерепной гипертензии характерна головная боль:

- а Распирающего характера
- б Распирающего характера в затылочной области
- в Пульсирующего характера по всей голове
- г Сдавливающего характера в лобно-теменной области

Для тенториального (намета мозжечка) синдрома Бурденко- Крамера характерны:

- а Боли в глазных яблоках
- б Светобоязнь
- в Кохлеовестибулярные расстройства
- г Верно А и Б
- д Все выше перечисленное

Компьютерная томография выявляет зону гиподенсивности в очаге ишемического инсульта от начала заболевания через:

- а 1 ч
- б 2 ч
- в 4 ч

г 6 ч и более

Не являются основными источниками информации о здоровье:

- а Официальная информация о смертности населения
- б Данные страховых компаний
- в Эпидемиологическая информация
- г Данные мониторинга окружающей среды и здоровья
- д Регистры заболеваний, несчастных случаев и травм

Волокна для нижних конечностей располагаются в тонком пучке задних канатиков по отношению к средней линии:

- а Латерально
- б Медиально
- в Вентрально
- г Дорсально

Цереброспинальная жидкость становится мутной, если цитоз превышает:

- а 10/мл
- б 100/мл
- в 300/мл
- г 1000/мл

Гиперактивацию симпатико-адреналовой системы в остром периоде черепно-мозговой травмы подавляют:

- а Нейролептиками
- б Антидепрессантами
- в Барбитуратами
- г Всеми перечисленными препаратами
- д Верно А и Б

Для дифтерийной полиневропатии характерно наличие:

- а Расстройств глубокой чувствительности
- б Бульбарных расстройств
- в Тазовых нарушений
- г Верно А и Б

д Верно Б и В

При вирусном двухволновом менингоэнцефалите обычно не бывает:

- а Лихорадки
- б Атрофических спинальных параличей
- в Плеоцитоза в ликворе
- г Радикулоневрита

Синдром Валленберга-Захарченко (латеральный медулярный синдром) возникает при закупорке:

- а Коротких циркулярных артерий моста
- б Длинных циркулярных артерий моста
- в Парамедианных артерий моста
- г Нижней передней артерии мозжечка
- д Нижней задней артерии мозжечка

Для лечения ортостатической гипотензии, обусловленной периферической вегетативной недостаточностью, наиболее эффективны следующие средства:

- а Дексаметазон
- б Флудрокортизон
- в Симпатомиметики
- г В-блокаторы
- д Верно А и Г
- е Верно Б и В

Сибсом называют:

- а Здорового родителя больного наследственным заболеванием
- б Ребенка больного наследственным заболеванием
- в Родного брата или сестру (но не близнецов) больного наследственным заболеванием
- г Верно А и В
- д Верно Б и В

Развитие гемипареза при черепно-мозговой травме свидетельствует:

- а О внутричерепной гематоме
- б Об ушибе мозга
- в О переломе костей черепа
- г Обо всем перечисленном
- д Верно А и Б

Среди первичных опухолей спинного мозга наиболее редко встречаются:

- а Глиомы
- б Гемангиомы
- в Невриномы
- г Менингиомы

Для коматозного состояния не характерно:

- а Снижением сухожильных рефлексов
- б Двусторонний симптом Бабинского
- в Угнетение брюшных рефлексов
- г Угнетение зрачков реакций
- д Целенаправленные защитные реакции

Информация статистики здравоохранения включает в себя:

- а Обеспеченность населения медицинскими кадрами
- б Анализ деятельности ЛПУ
- в Обеспеченность населения больничными койками
- г Все перечисленное

Волокна для туловища и верхних конечностей располагаются в клиновидном пучке задних канатиков по отношению к средней линии:

- а Латерально
- б Медиально
- в Вентрально
- г Дорсально

При демиелинизирующих полиневропатиях, в отличие от аксональных полиневропатий, при ЭНМГ наблюдаются:

- а Положительные острые волны при игольчатой ЭМГ
- б Увеличение амплитуды и длительности потенциалов двигательных единиц
- в Снижение скорости проведения по моторным нервным волокнам при стимуляционной ЭНМГ
- г Снижение амплитуды М-ответа при стимуляционной ЭНМГ

Из перечисленных антибиотиков наибольшей способностью проникать через ГЭБ обладает:

- а Цефалексин
- б Клиндамицин
- в Рифампицин
- г Цефтриаксон

Диабетическая полиневропатия развивается в результате:

- а Поражения сосудов периферических нервов
- б Нарушения метаболизма глюкозы
- в Токсического повреждения миелина периферических нервов
- г Всего перечисленного
- д Верно А и Б

Общесоматические проявления СПИДа включают:

- а Длительную лихорадку и ночные поты
- б Диарею и потерю массы тела
- в Генерализованную лимфаденопатию
- г Верно А и В
- д Все перечисленное

К структурам эфферентной нервной регуляции мозгового кровообращения относятся рецепторы:

- а Синокаротидной зоны

- б Магистральных мозговых сосудов
- в Вазомоторных центров ствола
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Наиболее частой причиной вегетативных кризов являются:

- а Тревожные невротические расстройства
- б Черепно-мозговая травма
- в Поражения гипоталамуса
- г Проплапс митрального клапана
- д Коллагенозы
- е Нейроинфекция

Фенотип- это совокупность признаков и свойств организма, проявление которых обусловлено:

- а Действием доминантного гена
- б Действием рецессивного гена
- в Взаимодействием генотипа и факторами среды
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Тяжесть черепно-мозговой травмы определяется по глубине и продолжительности:

- а Амнезии
- б Расстройства жизненно важных функций
- в Гемипареза
- г Всего перечисленного
- д Верно А и Б

Для спинальной опухоли эпидуральной локализации наиболее характерен:

- а Корешковый синдром
- б Синдром ликворного толчка
- в Симптом "вклинения"
- г Симптом остистого отростка
- д Верно А и Г
- е Верно Б и В

Для наблюдений за динамикой ангиоспазма у больного со спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием наиболее целесообразно использовать:

- а Ангиографию
- б Реоэнцефалографию
- в Компьютерную томографию
- г Транскраниальную доплерографию

Информация статистики здоровья включает в себя следующие показатели, кроме:

- а Работы стационара (работа койки в году, оборот койки, средние сроки пребывания больного на койке)
- б Младенческой и смертности
- в Общей заболеваемости
- г Инвалидности

Волокна болевой и температурной чувствительности (латеральная петля) присоединяются к волокнам глубокой и тактильной чувствительности (медиальная петля):

- а В продолговатом мозге
- б В мосту мозга
- в В ножках мозга
- г В зрительном бугре

Что чаще всего происходит с уровнем глюкозы при гнойном менингите:

- а Снижается
- б Повышается
- в Остается в пределах нормы
- г Снижается, затем повышается

Для лечения гиперосмолярного синдрома при тяжелой черепно-мозговой травме не следует применять:

- а Маннитол
- б Реополиглюкин
- в Полиглюкин
- г Альбумин
- д 5% раствор глюкозы

Для свинцовой полиневропатии характерно наличие:

- а Преимущественных парезов нижних конечностей
- б Преимущественных парезов верхних конечностей
- в Болей в конечностях
- г Онемения в конечностях
- д Всего перечисленного
- е Верно Б и В

При вирусных энцефалитах в ликворе наблюдается:

- а Лимфоцитарный плеоцитоз
- б Снижение содержания белка
- в Увеличение содержания хлоридов
- г Верно А и Б
- д Верно А и В

Периферическая вегетативная недостаточность наблюдается при следующих вариантах диабетических полоневропатий:

- а Проксимальной симметричной полиневропатии
- б Проксимальной асимметричной полиневропатии
- в Дистальной полиневропатии
- г Множественной мононевропатии
- д Всех перечисленных
- е Ни при чем из перечисленного

Кариотип - это совокупность особенностей хромосомного набора (комплекса) клетки, определяющаяся:

- а Числом половых хромосом
- б Формой хромосом
- в Структурой хромосом
- г Всем перечисленным
- д Верно А и Б

Наиболее постоянными очаговыми симптомами при эпидуральной гематоме являются:

- а Расширение зрачка на стороне гематомы
- б Расширение зрачка на противоположной стороне
- в Гемипарез на стороне гематомы
- г Гемипарез на противоположной стороне
- д Верно А и Г
- е Верно Б и В

Для интрамедуллярной спинальной опухоли наиболее характерно наличие:

- а Сегментарного диссоциированного расстройства чувствительности
- б Корешковых болей положения
- в Ранней блокады субарахноидального пространства
- г Рентгенологического симптома Элсберга-Дайка

Главной причиной церебральной ишемии при остром инфаркте миокарда с нарушением ритма (кардиocereбральный синдром) является:

- а Повышение вязкости крови
- б Повышение активности свертывающей системы
- в Ухудшение реологических свойств крови
- г Снижение системного перфузионного давления
- д Повышение агрегации форменных элементов крови

Основными показателями естественного движения населения являются:

- а Рождаемость, смертность
- б Смертность, заболеваемость
- в Инвалидность, смертность

Основным медиатором тормозного действия является:

- а Ацетилхолин
- б ГАМК

- в Норадреналин
- г Адреналин

Односторонний пульсирующий экзофтальм является признаком:

- а Ретробульбарной опухоли орбиты
- б Тромбоза глазничной артерии
- в Каротидно-кавернозного соустья
- г Супраселлярной опухоли гипофиза

- д Арахноидэндотелиомы крыла основной кости

При тяжелой черепно-мозговой травме преимущественно дегидратирующее действие на участки мозга с отеком оказывает:

- а Маннитол
- б Глицерин
- в Лазикс
- г Альбумин

Для мышьяковой полиневропатии характерно наличие:

- а Преимущественных поражений нервов ног
- б Багрово-синюшных полос на коленях
- в Белых полос на ногтях
- г Верно А и В
- д Верно А и Б

Характерными ЭЭГ- признаками очаговых некротических повреждений головного мозга при герпетическом энцефалите являются:

- а Диффузное снижение вольтажа волн
- б Появление б – 0 волн
- в Наличие пиков (спайков) и острых волн
- г Наличие асимметричных гигантских волн
- д Наличие сонных веретен

К гуморальным фактам регуляции мозгового кровообращения относятся:

- а Катехоламины
- б Пептиды
- в Липопротеины
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Для базисной терапии вегетативных кризов применяются следующие препараты:

- а б – блокаторы
- б Беллатаминал
- в Клоназепам
- г Трициклический антидепрессанты

- д Верно В и Г
- е Все перечисленное

Аутосомно – доминантный тип наследования отличается:

- а Преимущественным поражением лиц мужского пола
- б Преобладанием в поколении больных членов семьи
- в Проявлением патологического наследуемого признака во всех поколениях без пропуска
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Характерные диагностические признаки субдуральной гематомы получают:

- а При компьютерной томографии
- б При ангиографии
- в При эхоэнцефалографии
- г При всем перечисленном
- д Верно А и В

Спондилография наименее информативна, если опухоль спинного мозга локализует:

- а Интрамедуллярно
- б Субдурально
- в Эпидурально
- г Эпидурально - экстравертебрально

Решающее влияние на прогноз у больных с преходящим нарушением мозгового кровообращения оказывает:

- а Адекватный уровень артериального давления
- б Состояние вязкости и текучести крови
- в Состояние свертывающей системы крови
- г Сохранная проходимость приводящих артерий
- д Продолжительность эпизодов приходящей ишемии

Уровень рождаемости (на 1000 населения) в нашей стране в настоящее время находится в пределах:

- а От 5 до 10
- б От 11 до 15
- в От 16 до 20

Основной афферентный путь от стриопаллидарной системы следует:

- а К передним рогам спинного мозга
- б К ретикулярной формации
- в К таламусу
- г К моторной коре

Антинуклеарные антитела являются лабораторным маркером:

- а Тиреотоксикоза
- б Системной красной волчанки
- в Системной склеродермии
- г Болезни Гентингтона

Для коррекции дефицита дофаминергической активности при выходе из острейшего периода тяжелой черепно-мозговой травмы (апатический или акинетико-ригидный синдром) назначают:

- а Циклодол
- б Пирацетам
- в Энцефабол
- г Галоперидол
- д Наком

Сопутствующим симптомом полиневропатии при пернициозной анемии является:

- а Снижение уровня железа в сыворотке крови
- б Фуникулярный миелоз
- в Гиперацидный гастрит
- г Все перечисленное

Для этиотропной терапии герпетического энцефалита применяется:

- а Оксолин
- б Пефлоксацин
- в Ацикловир
- г Цефтриаксон

Симпатико – тоническая форма вегетативно – сосудистой дистонии характеризуется:

- а Дистальным акроцианозом
- б Потливостью
- в Тахикардией
- г Снижением температуры тела
- д Диареей

Наиболее частой причиной синдрома Горнера является:

- а Поражение ствола мозга
- б Поражение спинного мозга
- в Поражение корешка T1
- г Поражение шейной симпатической цепочки
- д Поражение симпатического сплетения внутренней сонной артерии

Аутосомно-рецессивный тип наследования отличается тем, что:

- а Соотношение здоровых и больных членов семьи равно 1:1
- б Заболевание не связано с кровным родством
- в Родители первого выявленного больного клинически здоровы
- г Верно А и Б

д Верно Б и В

Если после черепно-мозговой травмы развиваются ригидность затылочных мышц и светобоязнь при отсутствии очаговых симптомов, то наиболее вероятен диагноз:

- а Сотрясение мозга
- б Субарахноидальное кровоизлияние
- в Ушиб мозга
- г Внутричерепная гематома

Экстрamedулярные опухоли спинного мозга наиболее часто располагаются на его:

- а Переднебоковой поверхности
- б Задней поверхности
- в Задней и заднебоковой поверхности
- г Передней поверхности

К развитию тромбоза мозговых артерий не приводит:

- а Снижение артериального давления и замедление кровотока
- б Повышение вязкости и агрегации
- в Повышение коагуляционной активности крови
- г Повышение фибринолитической активности крови

Уровень общей смертности (на 1000 населения) в нашей стране в настоящее время находится в пределах:

- а От 5 до 10
- б От 11 до 15
- в От 16 до 20

Неустойчивость в позе Ромберга при закрывании глаз значительно усиливается, если имеет место атаксия:

- а Мозжечковая
- б Сенситивная
- в Вестибулярная
- г Любая

Для выявления оптикомнестической афазии следует:

- а Проверить устный счет
- б Предложить больному назвать окружающие предметы
- в Предложить больному почитать текст
- г Убедиться в понимании больным обращенной речи

К «дневным» транквилизаторам относится:

- а Мидазолам (флормидал)
- б Нитразепам (эуноктин)
- в Диазепам (реланиум)
- г Тофизепам (грандаксин)

Полиневропатия, связанная с недостаточностью витамина В1, возникает:

- а При хроническом алкоголизме
- б При порфирии
- в При пеллагре
- г Верно А и Б
- д Верно А и В

Решающее значение в диагностике менингита имеет:

- а Острое начало заболевания с повышением температуры
- б Острое начало заболевания с менингеальным синдромом
- в Изменения цереброспинальной жидкости
- г Признаки застоя на глазном дне
- д Верно А и Б

В развитии недостаточности кровоснабжения мозга при атеросклерозе играют роль следующие факторы:

- а Пропалс митрального клапана
- б Повышение фибринолитической активности крови
- в Снижение активности свертывающей системы крови
- г Стеноз магистральных сосудов шеи

д Все перечисленные

Вегетативные кризы часто сопровождаются следующими психопатологическими проявлениями:

- а Тревогой ожидания
- б Агорафобией
- в Ограничительным поведением
- г Всеми перечисленными
- д Верно А и В
- е Верно А и Б

Рецессивный тип наследования, связанный с X – хромосомой (сцепленный с полом), отличается тем, что:

- а Соотношение больных мужчин в каждом поколении равно 2:1
- б Заболевают только мужчины
- в Заболевают только женщины
- г Признаки болезни обязательно находят у матери пробанда
- д Неверно все перечисленное

Осложнение черепно - мозговой травмы кровоизлиянием в желудочки мозга характеризуется появлением в клинической картине:

- а Плавающего зрака
- б Горметонического синдрома
- в Гиперкатоболического типа вегетативных функций
- г Нарушение сознания
- д Двусторонних пирамидных стопных знаков

Чтобы купировать мышечные проявления нейрогенного гипервентиляционного синдрома, назначают:

- а Прозерин
- б Глюконат или хлорид кальция
- в Хлорид натрия
- г Хлорид калия
- д Все перечисленное
- е Верно А и Б

**Показатель младенческой смертности в России
в настоящее время находится в пределах:**

- а До 15
- б 15-20
- в Выше 20

**Регуляция мышечного тонуса мозжечка при
изменении положения тела в пространстве
осуществляется через:**

- а Красное ядро
- б Вестибулярные ядра
- в Ретикулярную формацию ствола
- г Всё вышеперечисленное

**Для выявления конструктивной апраксии
следует предложить больному:**

- а Поднять руку
- б Коснуться правой рукой левого уха
- в Сложить заданную фигуру из спичек
- г Имитировать различные движения

**Неотропные средства при черепно-мозговой
травме можно применять:**

- а Спустя 3 дня после травмы
- б Спустя неделю после травмы
- в В резидуальном периоде
- г В любые сроки
- д Верно Б и В

**Для диабетической полиневропатии
характерно:**

- а Поражение черепных нервов
- б Преимущественное поражение нервов верхних конечностей
- в Вегетативные расстройства
- г Верно А и Б
- д Верно А и В

**Серозный менингит может быть вызван
следующими бактериями:**

- а Гемофильной палочкой Афанасьева - Пфейффера (инфлюэнц-менингит)
- б Пневмококком
- в Микобактерией туберкулеза
- г Верно А и В
- д Верно Б и В

Очаговые поражения головного мозга редко наблюдаются:

- а При узелковом периартериите Куссмауля - Мейера
- б При неспецифическом аорто-артериите (болезни Такаясу)
- в При височном артериите Хортона - Магата - Брауна
- г При облитерирующем тромбангиите Винивартера – Бюргера
- д При гранулематозном ангиите Вегенера

Вегетативные кризы приходится дифференцировать со следующими состояниями:

- а Височной эпилепсией
- б Феохромоцитомой
- в Гипогликемией
- г Нейрогенной гипервентиляцией
- д Верно А, Б и В
- е Все перечисленное

Причиной хромосомных заболеваний могут быть:

- а Изменения числа хромосом
- б Изменения размера хромосом
- в Нарушения структуры хромосом
- г Влияние факторов внешней среды
- д Верно А, Б и В
- е Все перечисленное

Положительные диагностические признаки субарахноидального кровоизлияния могут быть получены:

- а При люмбальной пункции

- б При ангиографии
- в При компьютерной томографии
- г При всех перечисленных методах
- д Верно А и В

Наиболее часто эпилептические припадки наблюдаются:

- а При менигиомах
- б При поверхностно расположенных астроцитомах
- в При мультиформных глиобластомах
- г Ни при чем из перечисленного

Чтобы купировать мышечные проявления нейрогенного гипервентиляционного синдрома, назначают:

- а Прозерин
- б Глюконат или хлорид кальция
- в Хлорид натрия
- г Хлорид калия
- д Все перечисленное
- е Верно А и Б

В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие места занимают:

- а Инфекционные и паразитарные заболевания; болезни системы пищеварения; психические заболевания
- б Болезни системы кровообращения; новообразования; травмы и отравления
- в Новообразования; травмы и отравления; болезни органов дыхания

Биназальная гемианопсия наступает при поражении:

- а Центральных отделов перекреста зрительных нервов
- б Наружных отделов перекреста зрительных нервов

- в Зрительной лучистости
- г Зрительных трактов

Для выявления асинергии с помощью пробы Бабинского следует предложить больному:

- а Коснуться пальцем кончика носа
- б Осуществить быструю пронацию-супинацию вытянутых рук
- в Сесть из положения лежа на спине со скрещенными на груди руками
- г Стоя, отклониться назад

Для угнетения гиперактивности вестибуловегетативных рефлексов в остром периоде черепно-мозговой травмы назначают:

- а Анаприлин
- б Беллатаминал
- в Метоклопрамид
- г Верно все перечисленное
- д Верно Б и В

Полиневропатии при лейкозах возникают в результате:

- а Эндолюмбального введения преднизолона
- б Приема цитостатиков
- в Сдавления нервных стволов специфическими инфильтратами
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Наиболее эффективным антибиотиком (из перечисленных) при лечении гнойного менингита, вызванного синегнойной палочкой, является:

- а Бензилпенициллин
- б Клиндамицин
- в Эритромицин
- г Гентамицин

При шейном остеохондрозе чаще поражается артерия:

- а Базилярная (основная)
- б Позвоночная

- в Внутренняя сонная
- г Наружная сонная
- д Затылочная

Для вегетативных кризов, в отличие от феохромоцитомы, менее характерны:

- а Значительное повышение артериального давления
- б Повышенное потоотделение
- в Выраженное чувство страха
- г Сердцебиение
- д Все перечисленное
- е Ничего из перечисленного

Фенотипическими признаками хромосомных болезней являются:

- а Нарушения психического развития
- б Нарушения физического развития
- в Множественные пороки развития
- г Все перечисленное

Острая субдуральная гематома на компьютерной томограмме характеризуется зоной:

- а Гомогенного повышения плотности
- б Гомогенного понижения плотности
- в Неоднородного повышения плотности
- г Отека мозга

Опухолью передних отделов боковых желудочков наиболее часто является:

- а Менингиома
- б Хориодпапиллома
- в Эпендимома
- г Астроцитомы

Внутри мозговое обкрадывание очага ишемического инсульта наступает в результате:

- а Нарушения ауторегуляции кровообращения в очаге

- б Спазма сосудов пораженного участка мозга
- в Спазма сосудов неповрежденных отделов мозга
- г Расширения «здоровых» сосудов неповрежденных отделов мозга
- д Раскрытия артериовенозных анастомозов

Основные методы изучения заболеваемости:

- а По причинам смерти, по обращаемости, по данным медицинских осмотров
- б По данным переписи населения, по данным физического развития
- в По обращаемости, по данным физического развития

К концентрическому сужению полей зрения приводит поражение:

- а Зрительного тракта
- б Зрительного перекреста
- в Наружного коленчатого тела
- г Зрительной лучистости

Двусторонний экзофтальм является признаком:

- а Гиперпродукции тиреотропного гормона
- б Опухоли перекреста зрительных нервов
- в Роста краниофарингиомы вперед и вверх (в сторону передних клиновидных отростков турецкого седла)
- г Всего перечисленного
- д Верно Б и В

При аллергии на пенициллин не следует назначать:

- а Гентамицин
- б Ампиокс
- в Биомицин
- г Левомецетин
- д Морфоциклин

Для уремической полиневропатии характерно:

- а Снижение скорости проведения возбуждения по нервам
- б Поражение черепных нервов
- в Преобладание аксональной дегенерации
- г Все перечисленное

Клиническую картину острого лимфоцитарного хориоменингита Армстронга отличает значительная выраженность:

- а Высокой лихорадки
- б Менингеального синдрома
- в Гипертензивного синдрома
- г Нарушения сознания
- д Светобоязни

Решающим условием адекватного коллатерального кровообращения головного мозга при закупорке магистральных артерий головы является состояние:

- а Тонуса и реактивности сосудов
- б Реологических свойств крови
- в Свертывающей - противосвертывающей системы крови
- г Архитектоники артериального круга мозга (виллизиева круга)
- д Системной и центральной гемодинамики

Поражение периферической (сегментарной) вегетативной нервной системы проявляется следующими синдромами:

- а Периферической вегетативной недостаточностью
- б Ангиотрофалгическими синдромами
- в Нейрогенной тетанией
- г Кластерной головной болью
- д Верно А и Б
- е Всеми перечисленными

Индукцированный мутагенез вызывают следующие факторы:

- а Ультрафиолетовое излучение
- б Проникающая радиация
- в Химические вещества
- г Вирусы
- д Все перечисленные факторы
- е Верно Б и Г

Нарастание мидриаза на стороне эпидуральной гематомы и гемипареза на другой стороне обусловлено:

- а Асимметричной гидроцефалией
- б Сдавлением коры моторной области
- в Ущемлением ствола в затылочном отверстии
- г Сдавлением ножки мозга
- д Верно А и Б

Наиболее часто встречаются невриты нерва:

- а Зрительного
- б Тройничного
- в Слухового
- г Подъязычного
- д Добавочного

Для I стадии синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания не характерно наличие:

- а Гипокоагуляции
- б Гиперкоагуляции
- в Внутрисосудистой агрегации форменных элементов
- г Блокады микроциркуляции

Сущность термина «болезненность»:

- а Вновь выявленные заболевания в данном году
- б Все заболевания, зарегистрированные в данном году
- в Заболевания, выявленные при целевых медицинских осмотрах

- г Заболевания, выявленные при периодических медицинских осмотрах

При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия:

- а Биназальная
- б Гомонимная
- в Битемпоральная
- г Нижнеквадрантная со всеми перечисленными симптомами

Для синдрома Эйди характерны:

- а Односторонний птоз
- б Односторонний миоз
- в Спазм аккомодации
- г Односторонний мидриаз

Необходимым условием начала лечения больного с тяжелой черепно-мозговой травмой является:

- а Введение в вену кардиотонических средств
- б Введение в вену антигипертензивных средств
- в Освобождение дыхательных путей от инородных тел
- г Верно А и Б

Отличительными признаками острой перемежающейся порфирии является:

- а Выраженность сенситивной атаксии
- б Выраженность болевого синдрома
- в Тяжесть вялых параличей конечностей
- г Черный цвет кала
- д Красный цвет мочи

При менингитах, вызванных вирусами Коксаки и ЕСНО, наблюдаются:

- а Подострое начало без лихорадки
- б Полимиалгия
- в Нейтрофильный плеоцитоз

- г Тяжелое течение и грубые резидуальные симптомы
- д Верно В и Г

Диагноз дисциркуляторной энцефалопатии устанавливают, если имеются:

- а Субъективные жалобы, возникающие чаще 1 раза в неделю на протяжении последних 3 месяцев
- б Умеренные когнитивные нарушения
- в Нестойкая рассеянная церебральная микросимптоматика
- г Стойкая очаговая церебральная симптоматика

Поражение центральной (надсегментарной) вегетативной нервной системы проявляется следующими синдромами:

- а Рефлекторной вегетативной дистрофией
- б Нейроэндокринно-метаболическими расстройствами
- в Психовегетативным синдромом
- г Астеноневротическим синдромом
- д Верно Б и В
- е Всеми перечисленными

В основу классификации наследственных болезней, учитывающей их генетическую природу, положены особенности:

- а Генных мутаций
- б Хромосомных мутаций
- в Количественных изменений хромосом
- г Верно А и В
- д Все перечисленное

Краниографические признаки острой травмы черепа характеризуются:

- а «Пальцевыми вдавлениями»
- б Усиленным сосудистым рисунком
- в Увеличением глубины турецкого седла

- г Остеопорозом затылочной кости и затылочного полукольца
- д Ни одним из перечисленных признаков

Генерализованные эпилептиформные припадки чаще бывают при локализации опухоли в следующей доле мозга:

- а Лобной
- б Височной
- в Теменной
- г Затылочной
- д Одинаково часто в любой из перечисленных

Для тромбоза мозговых сосудов характерно:

- а Наличие в анамнезе транзиторных ишемических атак
- б Наличие симптомов предвестников
- в Постепенное формирование очаговой симптоматики
- г Малая выраженность общемозговой симптоматики
- д Отсутствие смещения М-эха

Международная классификация болезней- это:

- а Перечень наименований болезней в определенном порядке
- б Перечень диагнозов в определенном порядке
- в Перечень симптом, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
- г Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
- д Перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке

Гомонимная гемианопсия не наблюдается при поражении:

- а Зрительного тракта
- б Зрительного перекреста
- в Зрительной лучистости
- г Внутренней капсулы

Проведение отоневрологической калорической пробы противопоказано:

- а При остром нарушении мозгового кровообращения
- б При внутричерепной гипертензии
- в При коматозном состоянии
- г При перфорации барабанной перепонки
- д При всем перечисленном

При лечении тяжелой черепно-мозговой травмы в остром периоде для коррекции метаболического ацидоза показана внутривенная инфузия:

- а 5% раствора глюкозы
- б 4% раствора бикарбоната натрия
- в Раствора поляризующей смеси
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Характерными сопутствующими симптомами полиневропатии, вызванной миеломной болезнью, являются:

- а Упорные боли в костях
- б Клеточно-белковая диссоциация в ликворе
- в Патологические переломы костей
- г Верно Б и В
- д Верно А и В

Морфологическим субстратом восстановления функций нейрональных систем и клинической ремиссии при рассеянном склерозе являются:

- а Рассасывания фиброзной склеротической бляшки

- б Восстановление способности синтезировать нейромедиаторы в пораженных нейронах
- в Восстановление нормального кругооборота нейромедиаторов в межнейрональных синапсах
- г Периаксональная ремиелинизация

Субъективные церебральные симптомы при начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения мозга обычно появляются:

- а В утренние часы
- б В вечерние часы
- в После физической нагрузки
- г После эмоционального стресса
- д При условиях, требующих усиления кровоснабжения мозга

Наличие функциональных неврологических (псевдоневрологических) симптомов наиболее характерно:

- а Для гипервентиляционных приступов
- б Для вегетативных кризов
- в Для парциальных сложных припадков
- г Для демонстративных припадков
- д Для гипогликемических приступов
- е Для феохромоцитомы

Основным биохимическим признаком фенилкетонурии является повышением содержания:

- а Ванилилминдальной кислоты
- б Диоксифенилуксусной кислоты
- в Дигидроксифенилэтанола
- г Фенилпировиноградной кислоты
- д Всего перечисленного
- е Верно Б и В

Проникающей называют черепно-мозговую травму:

- а При ушибленной ране мягких тканей

- б При повреждении апоневроза
- в При переломе костей свода черепа
- г При всех перечисленных вариантах

**Адверсивные судорожные приступы
с насильственным поворотом головы в здоровую
сторону чаще наступают при локализации далее
мозга:**

- а Лобной
- б Теменной
- в Височной
- г Затылочной
- д Одинаково часто в любой из
перечисленных

**Для купирования мигренозного статуса не
применяются препараты:**

- а Противосудорожные и
противорвотные
- б Дегидратирующие и
глюкокортикоиды
- в Антихолинергические и
антихолинэстеразные
- г Транквилизаторы и
антидепрессанты
- д Антигистаминные и анальгетики

**Кто из перечисленных специалистов имеет
право на выдачу документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность:**

- а Врач станции скорой помощи
- б Врач станции переливания крови
- в Врач бальнеолечебницы
- г Врач приемного покоя больницы
- д Судебно-медицинский эксперт

Через верхние ножки мозжечка проходит путь:

- а Задний спинномозжечковый
- б Передний спинномозжечковый
- в Лобно - мосто - мозжечковый
- г Затылочно-височно-мосто-
мозжечковый

При комбинированной черепно-мозговой травме для лечения артериальной гипотензии в результате кровопотери предпочтение отдается назначению:

- а Кардиотонические средства
- б Симпатомиметиков
- в Низкомолекулярных декстранов
- г Осмотических диуретиков

Причиной наследственно обусловленной невропатии может быть:

- а Амилоидоз
- б Порфирия
- в Гепатоцеребральная дистрофия
- г Верно А и Б

При неустановленном возбудителе бактериального гнойного менингита целесообразно применять:

- а Цефалексин (цепорекс)
- б Клиндамицин (далацин)
- в Эритромецин (эритран)
- г Цефотаксим (клафоран)

Для декомпенсации начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга характерно:

- а Появление рассеянной неврологической симптоматики
- б Увеличение частоты и продолжительности эпизодов субъективных церебральных симптомов
- в Появление очаговой неврологической симптоматики
- г Верно все перечисленное

Эффект антидепрессантов при вегетативных кризах обычно наступает:

- а Немедленно
- б Через 3 дня
- в Через 1-2 недели
- г Через 2 -4 недели
- д Через 1 месяц

Для клинических проявлений гликогеновой миопатии (болезни Мак-Ардля) характерно наличие:

- а Болезненных спазмов в мышцах
- б Патологической мышечной утомляемости
- в Псевдогипертрофии мышц голени
- г Верно А и Б
- д Всего перечисленного

Необходимым условием начала лечения больного с тяжелой черепно-мозговой травмой является:

- а Введение в вену кардиотонических средств
- б Введение в вену антигипертензивных средств
- в Освобождение дыхательных путей от инородных тел
- г Верно А и Б

Симптом корешковых болей положения наиболее характерен:

- а Для эпидуральных неврином
- б Для субдуральных неврином
- в Для эпидуральных менингиом
- г Для субдуральных менингиом

Для инсульта, развивающегося по механизму сосудистой мозговой недостаточности, не характерно наличие:

- а Высокого артериального давления
- б Низкого артериального давления
- в Ортостатических эпизодов в анамнезе
- г Острой сердечной недостаточности

До какого срока лечащий врач может единолично продлить листок нетрудоспособности :

- а До 10 дней
- б До 30 дней
- в До 45 дней

г До 60 дней

Обонятельные галлюцинации наблюдаются при поражении:

- а Обонятельного бугорка
- б Обонятельной луковицы
- в Височной доли
- г Теменной доли

Интенционный тремор и гиперметрия при выполнении пальценосовой пробы характерны для:

- а Эссенциального тремора
- б Мозжечковой атаксии
- в Вестибулярной атаксии
- г Сенситивной атаксии
- д Всех перечисленных состояний

Для лечения посттравматической головной боли, обусловленной снижением внутричерепной гипертензии, назначают:

- а 5% раствора глюкозы
- б 0,9% раствора хлорида натрия
- в Дистиллированной воды
- г Любого из перечисленных препаратов
- д Верно А и Б

Для компрессионной невропатии локтевого нерва (синдром ущемления в области локтевого сустава) характерны:

- а Слабость II, III пальцев кисти
- б Атрофия мышц возвышения мизинца
- в Боли по ульнарной поверхности кисти
- г Все перечисленное
- д Верно Б и В

Для лечения менингококкового менингита следует выбрать:

- а Клиндамицин
- б Тетрациклин
- в Канамицин
- г Левомецетин

Симптомы начальных проявлений недостаточности кровоснабжения мозга характерно:

- а Эпизодическими
- б Перманентными
- в Латентными
- г Верно А и Б
- д Верно А и В

Для синдрома рефлекторной симпатической дистрофии характерны:

- а Снижение активности симпатической нервной системы
- б Снижение активности парасимпатической нервной системы
- в Диффузное повышение активности симпатической нервной системы
- г Регионарное повышение активности симпатической нервной системы
- д Верно А и Б
- е Верно В и Г

При поздней форме амавротической идиотии Куфса у взрослых наблюдается:

- а Глухота
- б Эпилептические припадки
- в Экстрапирамидные нарушения
- г Мозжечковые нарушения
- д Верно А и Б
- е Все перечисленное

Церебральными осложнениями эпидуральной гематомы являются:

- а Отек мозга
- б Компрессия мозга
- в Дислокация мозга
- г Нарушение ГЭБ
- д Все перечисленные
- е Верно А и В

Дугообразная деструкция пирамиды височной кости и сопутствующие штриховые дугообразные петрификаты являются характерным рентгенологическим признаком:

- а Невриномы слухового нерва
- б Холестеатомы мосто-мозжечкового угла
- в Невриномы тройничного нерва
- г Всех перечисленных новообразований

Для купирования приступа мигрени наиболее эффективны препараты:

- а Эрготамина
- б Анальгетики
- в Антигистаминные
- г Антисеротониновые
- д Противосудорожные

Какой документ выдается о нетрудоспособности, возникшей в следствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения:

- а Выдается справка на все дни
- б Листок нетрудоспособности не выдается
- в Выдается справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности
- г Выдается листок нетрудоспособности с отметкой о факте опьянения в истории болезни и в листке нетрудоспособности

Битемпоральная гемианопсия наблюдается при поражении:

- а Центральных отделов перекреста зрительных нервов
- б Наружных отделов перекреста зрительных нервов
- в Зрительных трактов перекреста зрительных нервов
- г Зрительной лучистости с двух сторон

Для выявления сенситивной атаксии следует попросить больного:

- а Осуществить фланговую походку
- б Встать в позу Ромберга и закрыть глаза
- в Стоя, отклониться назад или нагнуться вперед
- г Пройти по прямой линии

Для лечения посттравматической головной боли, обусловленной внутричерепной гипертензией, назначают:

- а Центральные антигипертензивные средства
- б Осмотические диуретики
- в Петлевые диуретики
- г Все перечисленное
- д Верно Б и В

Для компрессионной невропатии срединного нерва (синдром запястного канала) характерны:

- а Слабость IV, V пальцев
- б Атрофия мышц возвышения большого пальца
- в Усиление болей в кисти при её сгибании
- г Верно Б и В
- д Верно А и В

Субарахноидальное кровоизлияние как осложнение основного заболевания встречается при менингите, вызванном:

- а Пневмококком
- б Вирусом паротита
- в Клебсиеллой
- г Палочкой Афанасьева – Пфайффера
- д Стрептококком

Патогенетическим фактором головной боли при начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения головного мозга может быть:

- а Спазм артерий мозга

- б Гипотония и дилатация артерий мозга
- в Гипотония и дилатация вен мозга
- г Повышения напряжения мышц мягких тканей головы
- д Верно все перечисленное

Для развернутой (дистрофической) стадии рефлекторной симпатической дистрофии характерны:

- а Побледнение кожных покровов
- б Понижение температуры конечности
- в Гипергидроз
- г Отек конечности
- д Все перечисленное
- е Верно А, Б и Г

Для болезни Дауна характерно сочетание следующих признаков:

- а округлый череп, готическое нёбо, синдактилия, гипотония мышц
- б Долихоцефалия, расщепление нёба, арахнодактилия, гипертонус мышц
- в Краниостенотический череп, заячья губа, наличие шестого пальца, хореоатетоз
- г Наблюдается сочетание любых перечисленных признаков

Для коррекции метаболического ацидоза в остром периоде тяжелой травмы показана внутривенная инфузия:

- а 5% раствора глюкозы
- б 4% раствора бикарбоната натрия
- в Раствора поляризующей смеси
- г Любого из перечисленных растворов
- д Верно А и Б

Радиоизотопная у-сцинтиграфия головы малоинформативна:

- а При арахноидэндотелиомах
- б При менингосаркомах

- в При доброкачественных глиомах
- г При метастатических опухолях

Показание к гиперволемической гемодилюции при ишемическом инсульте является наличие:

- а Анурии
- б Сердечной недостаточности
- в Артериального давления ниже 120/60 мм
- г Артериального давления выше 200/100 мм
- д Гематокрита 42%

Кто имеет право направлять граждан на медико -социальную экспертизу:

- а Руководители ЛПУ и поликлиник
- б Лечащий врач самостоятельно
- в Лечащий врач с утверждения зав.отделением
- г Лечащий врач с утверждением направления КЭК ЛПУ

Истинное недержание мочи возникает при поражении:

- а Парацентральных долек передней центральной извилины
- б Шейного отдела спинного мозга
- в Поясничного утолщения спинного мозга
- г Конского хвоста спинного мозга

Для исключения невриномы слухового нерва необходимо проведение:

- а Аудиометрии
- б Компьютерной томографии
- в Магнитно-резонансной томографии
- г Всех перечисленных методов исследования

Противопоказание для лечебной физкультуры у больных с инсультом является:

- а Нарушение всех видов чувствительности

- б Резкая болезненность суставов
- в Нарушение функции тазовых органов
- г Сердечная недостаточность II-III
- д Нарушение координации

Для синдрома ущемления малоберцового нерва в области подколенной ямки характеры:

- а Слабость подошвенных сгибателей стопы
- б Гипотрофия перонеальной группы мышц
- в Гипалгезия наружной поверхности голени
- г Верно А и Б
- д Верно Б и В

Абцессы мозга как осложнение основного заболевания чаще встречаются при менингите, вызванном:

- а Палочкой Афанасьева-Пфайффера
- б Стафилококком
- в Пневмококком
- г Лептоспирами

Головокружение при начальных проявлениях недостаточности кровоснабжения головного мозга обусловлено:

- а Дисциркуляцией в ветвях внутренней сонной артерии
- б Дисциркуляцией в ветвях наружной сонной артерии
- в Колебаниями давления эндолимфы в улитке внутреннего уха
- г Дисциркуляцией в артериях вертебробазиллярного бассейна
- д Верно все перечисленное

Наиболее эффективным методом лечения рефлекторной симпатической дистрофии является:

- а Применение адrenoблокаторов

- б Кортикостероидная терапия
- в Блокада регионарных симпатических узлов
- г Применение капсаицина
- д Иглорефлексотерапия
- е Физиотерапия

Поражение нервной системы при лейкодистрофии происходит в результате:

- а Избыточного накопления липидов в нервных клетках
- б Утраты липидов нервными клетками
- в Распада липидов миелина и накопления продуктов распада в ЦНС
- г Всего перечисленного
- д Верно А и В

При комбинированной черепно-мозговой травме для лечения артериальной гипотензии в результате кровопотери предпочтение отдается назначению:

- а Кардиотонических средств
- б Симпатомиметиков
- в Низкомолекулярных декстранов
- г β -адренергических блокаторов
- д Осмотических диуретиков

Эхоэнцефалоскопия наиболее информативна при локализации опухоли:

- а В височной доле
- б В задней черепной ямке
- в В стволе мозга
- г В затылочной доле

Фибринолитическая терапия при закупорке сосудов мозга целесообразна в случае:

- а Молодого возраста больного
- б Продолжительности закупорки менее 6 часов
- в Отсутствия анурии
- г Геморрагического синдрома
- д Артериального давления ниже 200/100 мм

В каких случаях и кому медицинская помощь оказывается без согласия граждан или их представителей:

- а Несовершеннолетним детям
- б При несчастных случаях, травмах, отравлениях
- в Лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и нарушением обмена веществ
- г Лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами, с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих