

Рефлексотерапия. Редакция 2018

Вторая категория

**Что выдается после аккредитации
медицинскому учреждению:**

- А Диплом
- Б Сертификат
- В Лицензия
- Г Свидетельство

**Какие приказы регламентируют трудовую
деятельность врача – рефлексотерапевта:**

- А № 705-н от 09.12.2008 г
- Б № 541-н от 23.07.2010 г
- В № 364 от 10.12.1997 г. и № 38 от 03.02.1999
- Г № 705-н от 09.12.2008 г и № 541-н от 23.07.2010 г

**Какие управляющие точки меридианов
используют при диагностике для
рефлексотерапии:**

- А Тонизирующие
- Б Сигнальные
- В Противоболевые
- Г Седативные

**Какое сочетание точек в одной процедуре
считается правильным при болевом
синдроме в верхних конечностях:**

- А Односторонних в верхней половине тела
- Б Симметричных в верхней и нижней половинах тела
- В Симметричных на вентральной стороне
- Г Симметричных на дорсальной стороне тела.

**Какое сочетание точек в одной процедуре
считается правильным при парезе левой
нижней конечности:**

- А Перекрестных в верхней и односторонних в нижней половинах тела
- Б Односторонних на дорсальной стороне тела
- В Симметричных на дорсальной стороне тела
- Г Односторонних в верхней половине тела;

Укажите показания к применению точки P1:

- А Бронхиальная астма
- Б Межреберная невралгия
- В Мигрень
- Г Панкреатит

Выберите показания к применению точки Р 5:

- А Кашель, удушье, кровохарканье
- Б Энурез
- В Гастрит
- Г ИБС

Выберите показания к применению точки GI 4

- А Невропатия лицевого нерва
- Б Гастрит
- В Панкреатит
- Г Межреберная невралгия

Выберите показания к применению точки Е 6:

- А Гайморит
- Б Парез лицевого нерва
- В Ларингит
- Г Фарингит

Выберите показания к применению точки Е 21:

- А Стенокардия
- Б Спастические боли в кишечнике
- В Невралгия тройничного нерва
- Г Плече-лопаточный периартроз

Выберите показания к применению точки Е 41:

- А Отек лица
- Б Нарушение функции тазовых органов при нижнем парапарезе
- В Артериальная гипертония
- Г Лицевая невропатия

Выберите показания к применению точки RP 4:

- А Неврастения
- Б Вздутие живота, тошнота, рвота
- В Эпилепсия
- Г Плеврит

Выберите показания к применению точки RP 6:

- А Климакс
- Б Геморрой
- В Неврастения, психастения
- Г Стенокардия

Расположение точки Р 3:

- А Верхний отдел большой грудной мышцы
- Б Передненаружная поверхность средней части плечевой кости
- В На передней поверхности плеча, ниже уровня подмышечной впадины на 3 цуня, у наружного края двуглавой мышцы
- Г плеча

Расположение точки Р 7 возле:

- А Наружного сухожилия длинной отводящей мышцы первого пальца, в середине квадратной мышцы
- Б Сухожилия лучевого сгибателя кисти
- В Наружного края длинного сгибателя I
- Г Внутреннего края плече-лучевой мышцы

Расположение точки GI 10 возле:

- А Лучевого края лучевой кости
- Б Лучевого разгибателя кисти
- В Заднего края длинного разгибателя кисти и переднего края короткого лучевого разгибателя кисти
- Г Внутреннего края плече-лучевой мышцы

Расположение точки а GI 20 возле:

- А Грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
- Б Жевательной мышцы
- В Квадратной мышцы верхней губы
- Г Круговой мышцы рта

Расположение точки Е 8 возле:

- А Верхнего края височной мышцы
- Б В верхней части основания ушной
- В Над вершиной ушной раковины
- Г Верхнего края скуловой кости

Расположение точки RP 4 возле:

- А Бугра ладьевидной кости
- Б Отводящей мышцы I пальца
- В Нижнего края длинного сгибателя пальцев
- Г Нижнего края медиальной лодыжки

Расположение точки С 1 возле:

- А Внутреннего края двуглавой мышцы
- Б Внутреннего края короткой головки двуглавой мышцы плеча; нижнего края большой грудной мышцы
- В Кнутри от сухожилия двуглавой мышцы
- Г Наружного края двуглавой мышцы

Расположение точки IG 3в области:

- А V пястно-фалангового сустава
- Б IV пястно-фалангового сустава
- В V пястной кости, мышцы, отводящей V палец
- Г Внутренней поверхности V пястно-фалангового сустава

Иннервацию точки P 5 осуществляет:

- А Лучевой нерв
- Б Наружный кожный нерв предплечья
- В Поверхностная ветвь лучевого нерва
- Г Шейные кожные нервы

Точку P 9 иннервирует

- А Наружный кожный нерв предплечья
- Б Наружный кожный нерв плеча
- В Срединный нерв
- Г Плечевой нерв

Точку GI 4 иннервирует

- А Локтевой нерв
- Б Подмышечный нерв
- В Поверхностная ветвь лучевого нерва
- Г Тыльный кожный нерв плеча и предплечья

Точку GI 10 иннервирует:

- А Лучевой нерв
- Б Плечевой нерв
- В Подмышечный нерв
- Г Срединный нерв

Точку GI 11 иннервирует

- А Локтевой нерв
- Б Ветви срединного нерва
- В Лучевой нерв
- Г Подмышечный нерв

Точку GI 15 иннервирует:

- А Лучевой нерв
- Б Задний надключичный нерв
- В Подмышечный нерв
- Г Срединный нерв

Каково направление иглы при пункцире в точку GI 15:

- А Перпендикулярное и горизонтальное - спереди – назад
- Б Под острым углом - сверху вниз
- В Горизонтальное по направлению к шее
- Г Вертикальное по направлению к шее

Точку GI 17 иннервирует:

- А Шейные кожные нервы
- Б Надключичный нерв
- В Ветви диафрагмального нерва
- Г Ветви подмышечного нерва.

Точка GI 20 иннервируется:

- А Щечной ветвью лицевого нерва
- Б Второй ветвью тройничного нерва
- В Третьей ветвью тройничного нерва
- Г Большим затылочным нервом

Точку MC 3 иннервирует:

- А Медиальный кожный нерв плеча
- Б Срединный нерв
- В Лучевой нерв
- Г Локтевой нерв

Какой металл используют для акупунктурных игл:

- А Алюминий
- Б Сталь
- В Иридий
- Г Медь

Какова длина направителей для игл:

- А На 3-4 мм длиннее иглы
- Б Соответствовать длине иглы
- В На 3-4 мм короче иглы
- Г На 8-10 мм короче иглы

Акупунктура - это воздействие:

- А Иглами
- Б Пластинами
- В Магнитофорами
- Г Шариками

Какой элемент (символ) не входит в концепцию У-Син

- А вода
- Б огонь
- В земля
- Г трава

Выберите оптимальную толщину игл:

- А 0,15 мм
- Б 0,35 мм
- В 0,55 мм
- Г 0,85 мм

Для какого элемента концепции У-Син земля является стимулирующим элементом

- А огонь
- Б земля
- В вода
- Г дерево

Какова концентрация раствора этилового спирта для обработки кожи пациента перед рефлексотерапией

- А 40% р-ром этилового спирта
- Б 75% р-ром этилового спирта
- В 80% р-ром этилового спирта
- Г 85% р-ром этилового спирта

Игла удерживается следующим положением пальцев:

- А I палец с одной стороны, а - IV с другой
- Б I палец с одной стороны, а III - с другой
- В I палец с одной стороны, а III и IV - с другой
- Г I палец с одной стороны, а II и III - с другой

Согласно механизму обратной связи концепции У-Син каким элементом контролируется огонь

- А Вода
- Б Дерево
- В Земля
- Г Металл

Выбрать основные методы воздействия на БАТ

- А Сильный возбуждающий, слабый седативный
- Б Сильный седативный, слабый возбуждающий
- В Слабый тормозной, сильный тормозной
- Г Возбуждающий, тормозный, переходный

Длительность экспозиции игл при слабом варианте тормозного метода

- А Иглы не оставляют в теле человека
- Б 20-30 мин.
- В 10-15 мин.
- Г 3-5 мин.

Сколько точек используют при слабом варианте тормозного метода

- А 9-10
- Б 7-8

- В 5-6
- Г 1-2

Продолжительность воздействия при сильном варианте возбуждающего метода:

- А 10-15 мин.
- Б 3-5 мин.
- В Иглы не оставляют в теле
- Г 20-30 мин.

Сколько точек используют при сильном варианте возбуждающего метода

- А 9-10
- Б 3-4
- В 5-6
- Г 7-8

Продолжительность сеанса слабого варианта возбуждающего метода:

- А Иглы не оставляют в теле человека
- Б 20-30 мин.
- В 10-15 мин.
- Г 3-5 мин.

Сколько точек используют при слабом варианте возбуждающего метода:

- А 1-2
- Б 9-10
- В 7-8
- Г 5-6

Продолжительность сеанса при переходном (гармонизирующем) методе:

- А Иглы не оставляют в теле человека
- Б 35-60 мин.
- В 20-30 мин.
- Г 10-15 мин.

Сколько точек берут при гармонизирующем методе:

- А 1-2
- Б 7-8
- В 5-6
- Г 3-4

Длительность сеанса при сильном варианте тормозного метода

- А Иглы не оставляют в теле человека
- Б 10-15 мин.
- В 20-30 мин.

Г 35-60 мин.

Сколько точек берут при сильном варианте тормозного метода

А 5-6
Б 3-4
В 1-2
Г 7-8

Время экспозиции игл при микроиглотерапии:

А 1 сутки
Б 2 суток
В 3 суток
Г 5 суток

Аурикулярная акупунктура - это введение игл в точки:

А Живота
Б Уха
В Носа
Г Спины

Тонизирующая точка меридиана легких

А P5
Б P6
В P7
Г P9

Седативная точка меридиана легких

А P1
Б P5
В P6
Г P7

Точка-пособник меридиана легких

А P5
Б P6
В P7
Г P9

Сигнальная точка меридиана легких

А P1
Б P5
В P6
Г P7

Противоболевая точка меридиана легких

А P1
Б P5
В P6

Г P7

Ло-пункт меридиана легких

А P1

Б P5

В P6

Г P7

Тонизирующая точка меридиана толстой кишки

А GI 4

Б GI 6

В GI 7

Г GI 11

Седативная точка меридиана толстой кишки

А GI 2

Б GI 4

В GI 6

Г GI 7

Точка-пособник меридиана толстой кишки

А GI 2

Б GI 4

В GI 6

Г GI 7

Противоболевая точка меридиана толстой кишки

А GI 2

Б GI 4

В GI 6

Г GI 7

Ло-пункт меридиана толстой кишки

А GI 2

Б GI 4

В GI 6

Г GI 7

Тонизирующая точка меридиана желудка

А E 34

Б E 40

В E 41

Г E 42

Седативная точка меридиана желудка

А E 40

Б E 41

В Е 42
Г Е 45

Точка-пособник меридиана желудка

А Е 34
Б Е 40
В Е 41
Г Е 42

Противоболевая точка меридиана желудка

А Е 34
Б Е 40
В Е 41
Г Е 42

ЛО-пункт меридиана желудка

А Е 34
Б Е 40
В Е 41
Г Е 42

Часы максимальной активности меридиана легких

А 1-3
Б 3-5
В 5-7
Г 7-9

Часы максимальной активности меридиана толстой кишки

А 1-3
Б 3-5
В 5-7
Г 7-9

Часы максимальной активности меридиана желудка

А 1-3
Б 3-5
В 5-7
Г 7-9

Часы максимальной активности меридиана селезенки - 12 перстной кишки

А 5-7
Б 7-9
В 9-11
Г 11-13

Часы максимальной активности меридиана сердца

- A 5-7
- Б 7-9
- В 9-11
- Г 11-13

Часы максимальной активности меридиана тонкой кишки

- A 5-7
- Б 7-9
- В 13-15
- Г 11-13

Часы максимальной активности меридиана мочевого пузыря

- A 19-21
- Б 17-19
- В 15-17
- Г 13-15

Часы максимальной активности меридиана почек

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

Часы максимальной активности меридиана перикарда

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

Часы максимальной активности меридиана трех обогревателей

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

Часы максимальной активности меридиана желчного пузыря

- A 1-3
- Б 3-5
- В 23-1
- Г 21-23

Часы максимальной активности меридиана печени

- А 1-3
- Б 3-5
- В 5-7
- Г 7-9

Методы рефлексотерапии при заболеваниях органов дыхания у детей включают.

- А Корпоральную рефлексотерапию
- Б Поверхностное иглоукальвание (игольчатым молоточком, валиком)
- В Аурикулотерапию
- Г Корпоральную рефлексотерапию, микроиглотерапию, поверхностное иглоукальвание, аурикулотерапию

Рефлексотерапия заболеваний органов дыхания у детей:

- А Противопоказана
- Б Показана в остром периоде заболеваний
- В Показана в сочетании с физиотерапией
- Г Показана в восстановительном периоде заболеваний

На фоне применения гормональной терапии бронхиальной астмы у детей рефлексотерапия:

- А Противопоказана
- Б Показана после увеличения дозы гормонов
- В Показана
- Г Показана при постепенном снижении дозы гормонов

При хронических бронхитах, ларингитах, фарингитах и трахеитах у детей рефлексотерапия:

- А Показана
- Б Противопоказана
- В Только в сочетании с другими методами лечения
- Г Как самостоятельный метод лечения

При использовании электроакупунктуры на точки спины при приступе бронхиальной астмы у детей сила тока должна составлять

- А 30-50 мкА
- Б 50-75 мкА
- В 75-100 мкА
- Г 200-300 мкА

**В какой части ушной раковины
расположены точки AP80, 81**

- А Зона восходящей части завитка
- Б Зона ножки завитка
- В Зона козелка
- Г Зона мочки уха

**В какой части ушной раковины
расположены точки зрения**

- А Зона козелка
- Б Зона мочки уха
- В Зона надкозелковой вырезки
- Г Зона межкозелковой вырезки

**Применение рефлексотерапии при
бронхиальной астме в период ремиссии
включает.**

- А Массаж
- Б Микроиглотерапию
- В Баночный массаж
- Г Все способы рефлексотерапии.

**Рефлексотерапия при декомпенсированном
пороке сердца у детей:**

- А Показана
- Б Противопоказана
- В Возможна только в сочетании с другими методами лечения
- Г Рефлексотерапия в сочетании с кардиостимулятором.

**Какие номера аурикулярных точек
расположены на мочке уха**

- А 51-54
- Б 37-45
- В 22-24
- Г с 1 по 11

**Сколько нервов иннервируют ушную
раковину**

- А 4.
- Б 5.
- В 8.
- Г 6.

**Иглорефлексотерапия у детей
противопоказана при:**

- А Хроническом гастрите
- Б Язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- В Полипозе кишечника

Г Запорах

При лечении атонического запора ведущим методом иглорефлексотерапии является:

- А Возбуждающий
- Б Тормозной
- В Сочетание возбуждающего и первого тормозного методов
- Г Сочетание возбуждающего и второго тормозного

При лечении спастического запора ведущим методом иглорефлексотерапии являются:

- А Возбуждающий
- Б Тормозной
- В Первый возбуждающий метод
- Г Сочетание возбуждающего метода и электропунктуры

При желчно-каменной болезни у детей иглорефлексотерапия:

- А Показана
- Б Противопоказана
- В Показана в индивидуальных случаях-после обследования
- Г Показана в сочетании с медикаментозной терапией

При острых болях в животе неясной этиологии иглорефлексотерапия:

- А Показана
- Б Противопоказана
- В Показана после приема анальгетиков
- Г Показана в первые часы заболевания

Аурикулотерапия послеоперационного пареза кишечника, сочетаясь с корпоральной акупунктурой:

- А Ослабляет эффект лечения
- Б Усиливает эффект лечения
- В Вызывает ухудшение лечения заболевания
- Г Не влияет на эффект лечения

Ведущим методом иглорефлексотерапии при послеоперационном парезе кишечника является:

- А Возбуждающий
- Б Тормозной I вариант
- В Тормозной II вариант

Г Аурикулотерапия

При невротическом энурезе у детей из методов рефлексотерапии используются:

- А Прижигание
- Б Электропунктура
- В Аурикулотерапия
- Г Иглорефлексотерапия, прогревание, электропунктура, аурикулотерапия.

При заболеваниях мочевыделительной системы иглорефлексотерапия может быть применена:

- А После обследования и установления диагноза
- Б В остром периоде заболевания
- В В период ремиссии
- Г Через 7 дней от начала заболевания

Выбор точек и сочетание методов иглорефлексотерапии при энурезе у детей зависит от:

- А Типа высшей нервной деятельности
- Б Вегетативного профиля
- В Уровня поражения
Возраста, состояния центральной и вегетативной нервной системы, уровня поражения
- Г

В какой точке начинается внутренний ход меридиана желудка

- А E12
- Б E36
- В E3
- Г E10

Зонами воздействия пучком игл при энурезе у детей является:

- А Нижняя часть живота
- Б Поясничный отдел позвоночника
- В Передняя поверхность бедер
- Г Зоны сегментарной иннервации мочевого пузыря.

Оптимальное число сеансов рефлексотерапии для одного курса лечения энуреза составляет:

- А 3 сеанса
- Б 5 сеансов
- В 10 сеансов
- Г 12 сеансов

Иглорефлексотерапия показана у детей при следующих заболеваниях мочевыводящих путей:

- А Амилоидоз
- Б Гидронефроз
- В Острый гломерулонефрит
- Г Нефропатии, пиелонефрит, инфекции нижних мочевых путей

Принципы выбора метода иглорефлексотерапии при заболеваниях мочевыделительных путей у детей основаны на:

- А Этиологии и патогенезе заболевания
- Б Выраженности дизурического синдрома
- В Выраженности болевого синдрома
- Г Этиологии, патогенезе и клинических проявлениях заболевания

Для формирования II фазы рефлекса Ландау зона сегментарной иннервации охватывает:

- А T9- L3
- Б C8-T5
- В C1-C5
- Г T1-T5

Точками акупунктуры, используемыми в первые 2-3 сеанса лечения спастической диплегии у детей являются:

- А Воротниковая зона сегментарной иннервации, точки общего воздействия
- Б Точки кисти
- В Точки стопы
- Г Точки лица

При иглорефлексотерапии предусмотренных ощущений у детей младшего возраста:

- А Следует добиваться
- Б Добиваться не следует
- В Только в болевых точках
- Г В точках общего действия

Возрастные противопоказания к иглорефлексотерапии:

- А Имеют место
- Б Отсутствуют
- В Можно применять с 3-х лет жизни
- Г Можно применять с первого месяца жизни

Иглорефлексотерапия при гемофилии у детей:

- А Показана
- Б Противопоказана
- В После курса лечения у гематолога
- Г Показана, начиная с 3-х лет жизни

Иглорефлексотерапия при задержке миелинизации периферической и центральной нервной системы у детей:

- А Ускоряет процесс демиелинизации
- Б Противопоказана
- В Ускоряет процесс миелинизации
- Г Вызывает процессы демиелинизации

У ребенка снижено чувство страха при иглорефлексотерапии в возрасте:

- А До 10 лет
- Б До 6 лет
- В До 3 лет
- Г До 1,5 лет

При неврите лицевого нерва у детей можно начинать иглорефлексотерапию:

- А В остром периоде
- Б В подостром
- В В восстановительном периоде
- Г Непосредственно после установления диагноза

Иглорефлексотерапия в восстановительном периоде невралгии лицевого нерва у детей предусматривает воздействие на точки пораженной стороны лица:

- А Тормозным I методом
- Б Возбуждающим 1-2 методом
- В Возбуждающим II методом
- Г Возбуждающим I методом

Иглорефлексотерапия в восстановительном периоде невралгии лицевого нерва у детей предусматривает воздействие на точки здоровой стороны лица:

- А Тормозным I методом
- Б Тормозным 1-2 методом
- В Возбуждающим I методом
- Г Тормозным II методом

Ведущим методом иглорефлексотерапии постневритических контрактур мимических мышц у детей являются:

- А Тормозной 1-2 метод
- Б Возбуждающий II
- В Тормозной I
- Г Тормозной II

Точками, используемыми при лечении невралгии лицевого нерва у детей являются:

- А Местные, сегментарные, общего действия
- Б Общего действия
- В Сегментарные
- Г Шейно-воротниковой зоны

К точкам сегментарного воздействия, используемым для стимуляции формирования I фазы рефлекса Ландау относятся:

- А V10-15, VB 21, GI2, V11, V14-16, V41-43
- Б VC2-7, VB39, E31
- В MC4, C2, P5, C7
- Г MC3, MC5, MC6

К точкам общего действия, используемым для стимуляции формирования I фазы рефлекса Ландау относятся:

- А TR4, TR5-8, P7, V10-11, MC6; C5
- Б VC1-2, V21, 24-36. RP 6-10
- В E 21-29, VB 26-31, P4
- Г C3, MC3, P5

К точкам общего действия, используемым для стимуляции формирования II фазы рефлекса Ландау относятся:

- А E 36, 40, 41; P 3, P 4, VB 39-34, V 58-60, R 7, RP 6
- Б E21, 29, VB26-31, P4
- В P1-2, MC3, TR2, C7
- Г C1-3, E1-2, V20, VB26-28

К точкам, используемым при гашении синергии лабиринтно-тонического рефлекса относятся:

- А E 13-14, R 26-27, V13-14, V54-57
- Б VC16-19, V7-10, VB17-20
- В RP2, P3, E43
- Г P5-6; R1-3

При лечении детского церебрального паралича применяется следующая пара чудесных меридианов:

- А I-II
- Б III-IV
- В V-VI
- Г VII-VIII

Назовите число пропорциональных цуней голени

- А 10.
- Б 12.
- В 14.
- Г 16.

Каковы размеры индивидуального цуня человека

- А 2 см
- Б 1,5-3 см
- В 4 см
- Г 4,5 см

Иглорефлексотерапия противопоказана у детей:

- А Воспалении легких
- Б Анемии
- В Сколиозе
- Г При неясном диагнозе.

При гемипарезе у детей иглорефлексотерапия:

- А Показана с момента постановки, диагноза
- Б Противопоказана
- В Показана после года жизни
- Г Показана после 3-х месяцев жизни

Наиболее целесообразным способом лечения гемипареза у детей является:

- А Иглорефлексотерапия
- Б Информационно-волновая терапия
- В Электрофорез воротниковой зоны
- Г Комплексное лечение с включением иглорефлексотерапии

Из методов иглорефлексотерапии при спастическом гемипарезе у детей наиболее целесообразны:

- А Сочетание тормозного и возбуждающего
- Б Тормозной I
- В Тормозной II

Г Возбуждающий I

Методы рефлексотерапии при заболеваниях органов дыхания у детей включают.

- А Корпоральную рефлексотерапию
- Б Микроиглотерапию
- В Аурикулотерапию
- Г Корпоральную рефлексотерапию, микроиглотерапию, поверхностное иглоукалывание, аурикулотерапию.

Термопунктура является методом воздействия на АТ следующим фактором

- А Холод
- Б Лучистая энергия
- В Магнитное поле
- Г Тепло

Сочетание каких методов рефлексотерапии усиливает анальгезирующий эффект

- А Корпоральная и прогревание
- Б Аурикулярная и микроиглотерапия
- В Прогревание и прессация точек
- Г Корпоральная, аурикулярная, микроиглотерапия и электропунктура

Место рефлексотерапевтической помощи в общей системе здравоохранения:

- А Основное лечебно-профилактическое
- Б Диагностическое
- В Профилактическое
- Г Скоропомощное

Какие регламентируют трудовую деятельность врача – рефлексотерапевта:

- А № 705-н от 09.12.2008 г
- Б № 541-н от 23.07.2010 г
- В № 364 от 10.12.1997 г. и № 38 от 03.02.1999
- Г № 705-н от 09.12.2008 г и № 541-н от 23.07.2010 г

Какие функции клинико-экспертной комиссии являются основными:

- А Определение трудового прогноза
- Б Продление листа нетрудоспособности
Проведение экспертной оценки качества и эффективности лечебно-диагностического процесса и соответствиemedицинской помощи утвержденным стандартам и клиническим рекомендациям
- В Направление на консультацию
- Г

Точка TR 5 иннервируется:

- А Ветви срединного нерва
- Б Тыльный кожный нерв предплечья
- В Наружный кожный нерв предплечья
- Г Мышечно-кожный нерв.

Точку TR 10 иннервирует:

- А Локтевой нерв
- Б Ветви срединного и лучевого нервов
- В Мышечная ветвь лучевого нерва
- Г Срединный нерв

Точка TR 21 иннервируется:

- А Височно-ушным нервом
- Б Затылочным нервом
- В Второй ветвью тройничного нерва
- Г Малым затылочным нервом

Точка TR 22 иннервируется при участии:

- А Третьей ветвью тройничного нерва
- Б Височной ветвью лицевого нерва
- В Большим затылочным нервом
- Г Малым затылочным нервом

Какая точка меридиана трех обогревателей находится в зоне иннервации первой ветви тройничного нерва:

- А GI 19
- Б E 2
- В TR 23
- Г E 5

Точка E 1 иннервируется:

- А Лицевым нервом
- Б Подглазничным нервом
- В Первой и второй ветвью тройничного нерва
- Г Первой ветвью тройничного нерва

Точка C 5 иннервируется:

- А Лучевым нервом
- Б Внутренним кожным нервом предплечья и локтевым нервом
- В Кожно-мышечным нервом
- Г Срединным нервом

Точка C 9 иннервируется:

- А Лучевым нервом
- Б Локтевым нервом
- В Тыльным пальцевым нервом
- Г Внутренним кожным нервом предплечья

Точка E 6 иннервируется:

- А Второй ветвью тройничного нерва
- Б Малым затылочным нервом
- В Третьей ветвью тройничного нерва
- Г Тыльным пальцевым нервом

Точка E 8 иннервируется:

- А Третьей ветвью тройничного нерва
- Б Большим височно-ушным нервом
- В Первой ветвью тройничного нерва
- Г Второй ветвью тройничного нерва

Точка IG 1 иннервируется:

- А Тыльного пальцевого нерва
- Б Срединного нерва
- В Лучевого нерва
- Г Ладонным нервом пальцев

Точка IG 19 иннервируется:

- А Височно-ушным нервом
- Б Большим ушным нервом
- В Второй ветвью тройничного нерва

Г Третьей ветвью тройничного нерва

Точка E 25 иннервируется:

- А Передние кожные нервы восьмого межреберного нерва
- Б Ветвями десятого межреберного нерва
- В Ветви первого поясничного нерва
- Г Передние кожные ветви девятого межреберного нерва

Точка RP 1 иннервируется:

- А Поверхностным большеберцовым нервом
- Б Медиальный плюсневый нерв
- В Скрытый нерв голени
- Г Малоберцовый нерв голени

Точка RP 6 иннервируется:

- А Медиальный плюсневый нерв
- Б Тыльный кожный нерв голени
- В Медиальным кожным нервом голени
- Г Скрытый нерв голени

Точка RP 15 иннервируется:

- А Десятого межреберного нерва
- Б Нижним надчревным нервом
- В Верхнего надчревного нерва
- Г Первого поясничного нерва

Точка VB 14 иннервируется:

- А Надглазничным нервом
- Б Большим затылочным нервом
- В Первой ветвью тройничного нерва
- Г Малого затылочного нерва

Точка VB 39 иннервируется:

- А Глубоким икроножным нервом
- Б Передним поверхностным малоберцовым нервом
- В Медиальным кожным нервом голени
- Г Тыльным кожным нервом голени

Точка F 3 иннервируется:

- А Медиальным кожным нервом голени
- Б Тыльным нервом стопы
- В Глубоким малоберцовым нервом
- Г Глубоким большеберцовым нервом

Точка F 8 иннервируется:

- А Медиальным кожным нервом бедра
- Б Ветвью бедренного нерва
- В Ветвью запирательного нерва

Г Ветвью седалищного нерва

Точка F 12 иннервируется:

- А Кожной ветвью межреберного нерва
- Б Подвздошно-паховым нервом
- В Ветвью межреберного и поясничного
- Г Медиальным кожным нервом бедра

Точка VG 4 иннервируется:

- А Задней кожной ветвью второго поясничного нерва
- Б Задней кожной ветвью двенадцатого грудного нерва
- В Кожной ветвью подреберного нерва
- Г Ветвью поясничного сплетения

Точка VG 14 иннервируется:

- А Нижние шейные нервы
- Б Задней ветвью третьего шейного нерва
- В Задней ветвью восьмого шейного нерва
- Г задней ветвью шестого шейного нерва

Точка VG 20 иннервируется:

- А Лобным нервом
- Б Лицевым нервом
- В Затылочным нервом
- Г Височно-ушным нервом

Точка VG 24 иннервируется:

- А Передней ветвью переднего решетчатого нерва
- Б Лобным нервом
- В Первой ветвью тройничного нерва
- Г Большим затылочным нервом

Где расположена точка E 6:

- А Под скуловой дугой
- Б Спереди от височно-челюстного сустава
- В Над суставным отростком нижней челюсти
- Г Кпереди и кверху от угла нижней челюсти

Где расположена точка E 8:

- А Кнаружи от точки VG24 на 4,5 цуня
- Б На границе кожи лба и волосистой части головы
- В У верхнего края угла скуловой дуги
- Г На месте шва теменной и височной кости

Где расположена точка E 17:

- А В третьем межреберье
- Б Во втором межреберье

- В В четвертом межреберье по сосковой линии
- Г В пятом межреберье

Где расположена точка Е 25:

- А На наружной поверхности прямой мышцы живота выше пупка на 2 цуня
- Б На уровне пупка и кнаружи от пупка на 2 цуня
- В На 2 цуня ниже пупка, и на 2 цуня кнаружи
- Г На 4 цуня выше пупка по наружной поверхности прямой мышцы живота

Где расположена точка RP 1:

- А На 0,1 см кнутри от угла ногтевого ложа II пальца стопы
- Б На 0,2 см. кнутри от угла ногтевого ложа III пальца стопы
- В На 0,4 см. кнутри от угла ногтевого ложа IV пальца стопы
- Г На 0,3 см кнутри от угла ногтевого ложа I пальца стопы

Где расположена точка RP 6:

- А У заднего края большеберцовой кости, выше верхнего края внутренней лодыжки на 2 цуня
- Б У переднего края ахиллова сухожилия на 2 цуня выше верхнего края внутренней лодыжки
- В У переднего края ахиллова сухожилия на 3 цуня выше верхнего края наружной лодыжки
- Г На внутренней поверхности голени, кзади от большеберцовой кости на 3 цуня выше верхнего края внутренней лодыжки

Где расположена точка RP 9:

- А На внутренней поверхности голени на 8 цуней выше внутренней лодыжки
- Б На внутренней поверхности большеберцовой кости во впадине ниже нижнего края коленной чашечки на 2 цуня, в треугольной щели, у места прикрепления портняжной мышцы на 3 цуня ниже центра коленной чашечки
- В На внутренней поверхности бедра выше верхнего края коленной чашечки на 1 цунь
- Г На 2 цуня ниже нижнего края коленной чашечки с наружной стороны

Назовите число чудесных меридианов

- А 6.

- Б 8.
- В 12.
- Г 4.

При каком страдании укалывание точки GI 11 наиболее эффективно:

- А Опухоли желудка
- Б Нарушение перистальтики кишечника
- В Остром гепатите
- Г Калькулезном холецистите

На какие зоны ушной раковины целесообразно воздействовать при вертеброгенном корешковом синдроме:

- А Чаши
- Б Противозавитка; ладьи
- В Завитка
- Г Козелка

Выберите наиболее эффективные точки при кокцигодинии:

- А GI10, V40, V34
- Б GI4, E44, E25
- В VG20, V30, V60. VG1, VG2, VG4
- Г RP 6, F 13, E 36

Выберите анальгетическую комбинацию при ишиалгии:

- А V 60, E30, E40, RP6, VB41, VB43
- Б VB21, V11, VG14
- В VG4, V23, V30
- Г GI4, E44, E25

При люмбаго наиболее эффективные корпоральные точки:

- А VG4, V40, V 60
- Б V 20, V 21, VG14
- В V 22, V 23, V 25
- Г V 53, V54, V36

При люмбаго наиболее эффективные аурикулярные точки:

- А Вершины козелка, нулевая, симпатическая
- Б Поясничного отдела позвоночника, шэнь-мэнь, люмбаго, крестца
- В Таламуса, коры головного мозга
- Г Симпатическая

Аурикулярные точки, часто используемые при корешковом синдроме L5 - S1:

- А Таза, тазобедренного сустава, пятки
- Б Крестца, седалищного нерва, коленного сустава
- В Вершины козелка, надпочечников
- Г Пояснично-крестцового отдела позвоночника

Когда показана рефлексотерапия после операции удаления грыжи диска:

- А 3 часа после операции
- Б 24 часа после операции
- В 12 часов после операции
- Г 6 часов после операции

Из методов рефлексотерапии целесообразны в послеоперационном периоде после дискэктомии:

- А Электростимуляция
- Б Корпоральная рефлексотерапия
- В Лазерорефлексотерапия
- Г Аурикулопунктура

Гериятрия это:

- А Раздел биологии и медицины, изучающий закономерности старения живых существ, в том числе и человека.
- Б Наука, изучающая возможность влияния на процесс преждевременного старения
- В Наука, изучающая возможности омоложения организма
- Г Область клинической медицины, изучающая болезни людей пожилого и старческого возраста

Выберите эффективную комбинацию для лечения лучевой невропатии:

- А IG3, IG8, IG10, VB39
- Б TR5, TR15, TR16, E36
- В MC6, MC8, P7, P9
- Г GI4, GI10, V11, VG14

Выберите эффективную комбинацию для лечения плече-лопаточной периартропатии:

- А MC3, MC8, P7, P9
- Б VB21, VB38, V40, V60
- В GI4, GI15, GI16, V11
- Г IG8, IG10, TR5, TR10

**Назовите протвиболевую точку меридиана
трех обогревателей**

- A TR7
- Б TR5
- В TR15
- Г RP6

**Выберите наиболее эффективное сочетание
точек при гемипарезе на фоне инсульта:**

- A C7, RP6, E36, E40
- Б VC17, VC14, VC12
- В V10, V17, V23
- Г VG20, V7, VG16

**Выберите эффективное сочетание точек при
астено-невротическом синдроме:**

- A C7, MC6, RP 6
- Б GI20,IG19,TR23
- В P1, MC1, P11
- Г GI4, IG3, TR10

**Часы минимальной активности меридиана
легких**

- A 19-21
- Б 17-19
- В 15-17
- Г 13-15

**Часы минимальной активности меридиана
толстой кишки**

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

**Часы минимальной активности меридиана
желудка**

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

**Часы минимальной активности меридиана
селезенки-12 перстн. кишки**

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

Часы минимальной активности меридиана сердца

- A 23-1
- Б 21-23
- В 19-21
- Г 17-19

Часы минимальной активности меридиана тонкой кишки

- A 1-3
- Б 3-5
- В 5-7
- Г 7-9

Часы минимальной активности меридиана мочевого пузыря

- A 1-3
- Б 3-5
- В 5-7
- Г 7-9

Часы минимальной активности меридиана почек

- A 1-3
- Б 3-5
- В 5-7
- Г 7-9

Часы минимальной активности меридиана перикарда

- A 1-3
- Б 3-5
- В 5-7
- Г 7-9

Часы минимальной активности меридиана трех обогревателей

- A 5-7
- Б 7-9
- В 9-11
- Г 11-13

Часы минимальной активности меридиана желчного пузыря

- A 5-7
- Б 7-9
- В 9-11
- Г 11-13

Часы минимальной активности меридиана печени

- A 17-19
- Б 15-17
- В 13-15
- Г 11-13

**Ло-пункт меридиана селезенки и
поджелудочной железы**

- A RP 2
- Б RP 3
- В RP 4
- Г RP 5

Тонизирующая точка меридиана сердца

- A C 5
- Б C 6
- В C 7
- Г C 9

Седативная точка меридиана сердца

- A C 3
- Б C 5
- В C 6
- Г C 7

Точка-пособник меридиана сердца

- A C 3
- Б C 5
- В C 6
- Г C 7

Противоболовая точка меридиана сердца

- A C 3
- Б C 5
- В C 6
- Г C 7

Ло-пункт меридиана сердца

- A C 3
- Б C 5
- В C 6
- Г C 7

**Тонизирующая точка меридиана тонкой
кишки**

- A IG 3
- Б IG 4
- В IG 6
- Г IG 7

Седативная точка меридиана тонкой кишки

A IG 4
Б IG 6
B IG 7
Г IG 8

Точка-пособник меридиана тонкой кишки

A IG 3
Б IG 4
B IG 6
Г IG 7

Противоболевая точка меридиана тонкой кишки

A IG 3
Б IG 4
B IG 6
Г IG 7

Ло-пункт точка меридиана тонкой кишки

A IG 3
Б IG 4
B IG 6
Г IG 7

Тонизирующая точка меридиана мочевого пузыря

A V 63
Б V 64
B V 65
Г V 67

Седативная точка меридиана мочевого пузыря

A V 58
Б V 63
B V 64
Г V 65

Точка-пособник меридиана мочевого пузыря

A V 58
Б V 63
B V 64
Г V 65

Противоболевая точка меридиана мочевого пузыря

A V 58
Б V 63
B V 64
Г V 65

**Внутренний ход меридиана мочевого пузыря
начинается с точки:**

А	V 63
Б	V 23
В	V 30
Г	V 33

Ло-пункт меридиана мочевого пузыря

А	V 58
Б	V 63
В	V 64
Г	V 65

Тонизирующая точка меридиана почек

А	R 3
Б	R 4
В	R 5
Г	R 7

Седативная точка меридиана почек

А	R 1
Б	R 3
В	R 4
Г	R 5

Точка-пособник меридиана почек

А	R 1
Б	R 3
В	R 4
Г	R 5

Противоболевая точка меридиана почек

А	R 1
Б	R 3
В	R 4
Г	R 5

Ло-пункт точка меридиана почек

А	R 1
Б	R 3
В	R 4
Г	R 5

Тонизирующая точка меридиана перикарда

А	MC 4
Б	MC 6
В	MC 7
Г	MC 9

Седативная точка меридиана перикарда

А	MC 1
Б	MC 4
В	MC 6
Г	MC 7

Точка-пособник меридиана перикарда

А	MC 1
Б	MC 4
В	MC 6
Г	MC 7

Противоболевая точка меридиана перикарда

А	MC 1
Б	MC 4
В	MC 6
Г	MC 7

Ло-пункт точка меридиана перикарда

А	MC 1
Б	MC 4
В	MC 6
Г	MC 7

Тонизирующая точка меридиана тех обогревателей

А	TR 3
Б	TR 4
В	TR 5
Г	TR 7

Седативная точка меридиана тех обогревателей

А	TR 4
Б	TR 5
В	TR 7
Г	TR 10

Точка-пособник меридиана тех обогревателей

А	TR 3
Б	TR 4
В	TR 5
Г	TR 7

Специфическая потивоболевая точка для неотложной помощи

А	TR 3
Б	GI 4
В	V30

Г V11

Ло-пункт меридиана тех обогревателей

А TR 3

Б TR 4

В TR 5

Г TR 7

Тонизирующая точка меридиана желчного пузыря

А VB 38

Б VB 37

В VB 40

Г VB 43

Седативная точка меридиана желчного пузыря

А VB 36

Б VB 38

В VB 37

Г VB 40

Точка-пособник меридиана желчного пузыря

А VB 36

Б VB 38

В VB 37

Г VB 40

Противоболевая точка меридиана желчного пузыря

А VB 36

Б VB 38

В VB 37

Г VB 43

Ло-пункт меридиана желчного пузыря

А VB 36

Б VB 38

В VB 37

Г VB 40

Тонизирующая точка меридиана печени

А F 3

Б F 5

В F 6

Г F 8

Седативная точка меридиана печени

А F 2

Б F 3

В F 5
Г F 6

Точка-пособник меридиана печени

А F 2
Б F 3
В F 5
Г F 6

Противоболевая точка меридиана печени

А F 2
Б F 3
В F 5
Г F 6

Ло-пункт точка меридиана печени

А F 2
Б F 3
В F 5
Г F 6

Какие приказы регламентируют трудовую деятельность врача – рефлексотерапевта:

- А № 705-н от 09.12.2008 г
- Б № 541-н от 23.07.2010 г
- В № 364 от 10.12.1997 г. и № 38 от 03.02.1999
- Г № 705-н от 09.12.2008 г и № 541-н от 23.07.2010 г

Место рефлексотерапевтической помощи в общей системе

- А Основное лечебно-профилактическое
- Б Диагностическое
- В Профилактическое
- Г Скорпомощное

Сигнальная точка меридиана легких

- А P1
- Б P2
- В P3
- Г P4

Сигнальная точка меридиана толстой кишки

- А VC 5
- Б VC 12
- В E25
- Г MC1

Сигнальная точка меридиана желудка

- А VC 5
- Б VC 12
- В E25
- Г MC1

Сигнальная точка меридиана селезенки-поджелудочной железы

- А VC 5
- Б F 13
- В E25
- Г MC1

Сигнальная точка меридиана сердца

- А P1
- Б VC 3
- В VC 4
- Г VC 14

Сигнальная точка меридиана тонкой кишки

А	P1
Б	VC 3
В	VC 4
Г	VC 14

Сигнальная точка меридиана мочевого пузыря

А	P3
Б	VC 3
В	VC 4
Г	VC 14

Сигнальная точка меридиана почек

А	P3
Б	VC 3
В	VC 4
Г	VB 25

Сигнальная точка меридиана перикарда

А	VB 25
Б	F 13
В	E25
Г	VC17

Сигнальная точка трех обогревателей

А	P3
Б	VC 3
В	VC 5
Г	VC 25

Сигнальная точка желчного пузыря

А	P3
Б	VB 24
В	VC 5
Г	VC 25

Сигнальная точка печени

А	VC 25
Б	F 14
В	E25
Г	MC1

Сочувственная точка печени

А	V 18
Б	V 19
В	V 20
Г	V 21

Сочувственная точка желчного пузыря

A	V 18
Б	V 19
B	V 20
Г	V 21

Сочувственная точка трех обогревателей

A	V 20
Б	V 21
B	V 15
Г	V 22

Сочувственная точка перикарда

A	V 7
Б	V 13
B	V 14
Г	V 17

Сочувственная точка почек

A	V 20
Б	V 21
B	V 15
Г	V 23

Сочувственная точка мочевого пузыря

A	V 20
Б	V 21
B	V 28
Г	V 23

Сочувственная точка тонкой кишки

A	V 20
Б	V 27
B	V 28
Г	V 23

Сочувственная точка сердца

A	V 20
Б	V 21
B	V 15
Г	V 22

**Сочувственная точка селезенки -
поджелудочной железы**

A	V 20
Б	V 21
B	V 15
Г	V 22

Сочувственная точка желудка

A	V 20
Б	V 21

- В V 15
- Г V 22

Сочувственная точка толстой кишки

- А V 20
- Б V 21
- В V 25
- Г V 22

Сочувственная точка легких

- А V 7
- Б V 13
- В V 14
- Г V 17

Главная философская теория в рефлексотерапии

- А Инь-ян
- Б У-син
- В Мать-сын
- Г Полдень-полночь

Рефлексотерапия пораженных в чрезвычайных ситуациях с нарушением сердечно-сосудистой деятельности противопоказана при:

- А Коллапсе
- Б Артериальной гипертензии
- В Остром инфаркте миокарда
- Г При обмороке

Рефлексотерапия в акушерстве применяется как метод:

- А Обезболивающего воздействия
- Б Общеукрепляющего действия
- В Иммуностимулирующего действия
- Г Нейроэндокринной регуляции

Иглорефлексотерапия у детей противопоказана при:

- А Хроническом гастрите
- Б Язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- В Запорах
- Г Полипозе кишечника

При лечении спастического запора у детей ведущим методом иглорефлексотерапии являются:

- А Возбуждающий

- Б Сочетание возбуждающего метода и электропунктуры
- В Первый возбуждающий метод
- Г Тормозный

В остром периоде бронхиальной астмы у детей используются:

- А Иглорефлексотерапия
- Б Глюкокортикостероиды
- В Антидепрессанты
- Г Психостимуляторы

Аурикулотерапия послеоперационного пареза кишечника, сочетаясь с корпоральной акупунктурой:

- А Ослабляет эффект лечения
- Б Не влияет на эффект лечения
- В Вызывает ухудшение лечения заболевания
- Г Усиливает эффект лечения

Иннервацию точки P4 осуществляет:

- А наружный кожный нерв предплечья
- Б мышечно-кожный нерв
- В лучевой нерв
- Г наружный кожный нерв плеча

Иннервацию точки GI 4 осуществляет:

- А поверхностная ветвь лучевого нерва
- Б подмышечный нерв
- В тыльный кожный нерв плеча и предплечья
- Г локтевой нерв

Иннервацию точки GI 20 осуществляет:

- А щечная ветвь лицевого нерва, глазничный нерв
- Б второй ветвью тройничного нерва
- В шейными кожными нервами
- Г третьей ветвью тройничного нерва

Иннервацию точки MC 8 осуществляет:

- А общий ладонный нерв пальцев, ветви срединного, локтевого и лучевого нервов
- Б кожный нерв предплечья
- В тыльный нерв пальцев
- Г мышечно-кожный нерв

Иннервацию точки TR 10 осуществляет:

- А внутренний кожный нерв плеча, мышечные ветви лучевого нерва
- Б ветви срединного нерва
- В малый ушной нерв

Г локтевой нерв

Иннервация точки GI 19 осуществляется за счет:

А первая ветвь тройничного нерва
Б вторая ветвь тройничного нерва
В лицевой нерв
Г сегмент С2

Иннервация точки E1 осуществляется за счет:

А подглазничный нерв
Б лицевой нерв
В локтевой нерв
Г сегмент С2

Иннервация зоны точки С9 осуществляется за счет:

А ветвей локтевого нерва
Б внутреннего кожного нерва предплечья
В тыльного пальцевого нерва
Г лучевого нерва

Иннервацию точки VB 44 осуществляет:

А тыльный нерв пальцев
Б плюсневый нерв пальцев
В медиальный кожный нерв стопы
Г локтевой нерв

Иннервацию точки E 25 осуществляют:

А ветви межреберного нерва
Б подвздошно-паховый нерв
В ветви первого поясничного нерва
Г надключичный нерв

Показаниями к применению точки P 11 является:

А Затруднение дыхания, обморок, кровотечение из носа
Б Неврастения
В Недержание мочи
Г Острый цистит

Показаниями к применению точки P 1 являются:

А Колит
Б Бронхиальная астма
В Цистит
Г Мигрень

Показаниями к применению точки Р 7 являются:

- А Аднексит
- Б Колит
- В Цистит
- Г Боли в области сердца

С каким меридианом имеется стабилизирующий пункт Ло у меридиана легких

- А толстой кишки
- Б печени
- В сердца
- Г желудка

Икота представляет собой рефлекторный акт, эффекторной частью которого является:

- А Языко-глоточный нерв
- Б Симпатические нервы
- В Диафрагмальный нерв
- Г Тройничный нерв

Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:

- А Козелке
- Б Завитке
- В Чашечке раковины
- Г Полости раковины

Механизм анальгетического действия рефлексотерапии определяется

- А Тормозное влияние на центральные механизмы модуляции боли
- Б Снижение концентрации ионов кальция
- В Снижение выработки простагландинов
- Г Повышение уровня допамина

При воздействии на точки ушной раковины анальгетический эффект от иглорефлексотерапии:

- А Возникает только в сочетании с точечным массажем
- Б Возникает только при повторных
- В Не возникает
- Г Возникает и максимально проявляется

Противопоказанием к проведению рефлексотерапии в пожилом возрасте является:

- А Спондилёз

- Б Сердечная недостаточность выше 2 Б степени
- В Спондилоартроз
- Г Ишиалгия

Противопоказанием к проведению рефлексотерапии в пожилом возрасте являются:

- А Инфаркт миокарда в анамнезе (1 год)
- Б Психомоторное возбуждение
- В Атеромы
- Г ОНМК в анамнезе (1 год)

Противопоказание для рефлексотерапии при табакокурении

- А Астенизация
- Б Абстиненция
- В Тревожность
- Г Отсутствие мотивации

Иннервацию точки GI 18 осуществляет:

- А шейные кожные нервы
- Б лицевой нерв
- В большой ушной нерв
- Г подмышечный нерв

Иннервация точки E6 осуществляется за счет:

- А второй ветви тройничного нерва
- Б большого ушного нерва
- В малого затылочного нерва
- Г третьей ветви тройничного нерва

Иннервацию точки VB 39 осуществляют:

- А передний поверхностный малоберцовый нерв
- Б глубокий икроножный нерв
- В латеральный кожный нерв икры
- Г медиальный кожный нерв голени

Иннервация точки F 8 осуществляется за счет:

- А медиального кожного нерва бедра
- Б малоберцового нерва
- В скрытого нерва икры
- Г ветви запирающего нерва

Показания к применению точки P 9 являются:

- А аллергический ринит
- Б Колит атонический

- В Бронхоэктатическая болезнь
- Г Одышка, удушье

Показаниями к применению точки Р 2 являются:

- А Колит
- Б Отит
- В Боли в области плеча
- Г Аднексит

Противопоказаниями к применению точки Р 2 являются:

- А Плеврит
- Б Эмфизема легких
- В Тонзиллит
- Г Пневмосклероз

Подберите вариант эффективного сочетания точек при головной боли напряжения:

- А VC14, VG2, VG3, VG5
- Б E8, V2, V3, VB1
- В V60, V67, RP1, RP2
- Г R3, R4, V67, E43

При невралгии левого затылочного нерва используют следующее сочетание точек:

- А V26, V27, V32, V54
- Б V64, VB40, E36, R10
- В E26, RP14, F13, VC5
- Г V10, VB20, VB12, TR17

У больного с депрессией используют следующее сочетание точек

- А V17, V19, VG13, VB25
- Б C3, C7, F8, VC6, VC12
- В F13, V18, VC18, R25
- Г E32, GI11, VB24, VC20

При невралгии левого языкоглоточного нерва используют следующее сочетание точек:

- А E57, GI20, TR17, TR21
- Б VG17, IG15, V11, V9
- В RP18, RP17, MC1, E17
- Г V21, V27, V31, V32

При невралгии правого малоберцового нерва используют следующее сочетание точек :

- А V18,VC12, V25, V26
- Б VB31, VB34, E36, E40
- В VB13,V10, VG11,P9
- Г V43,GI15,V57,VG20

При верхнешейном ганглионите используют следующее сочетание точек:

- А R10, R2-6, E25, VC7-4
- Б VB34, VB30, V51-54, VG3
- В VB10, 21, V8-13, VG13-15
- Г F14, RP15-16, VC9-10

Какая акупунктурная точка имеет выраженный анальгезирующий эффект?

- А AT 55
- Б AT 26a
- В AT 51
- Г AT 33

При невралгии тройничного нерва используют следующее сочетание точек:

- А GI4, GI10, GI20, V60
- Б V11, VB21, VB39, V40
- В TR5, TR15, TR23, IG3
- Г VB14, IG18, VC24, GI4

При невралгии лицевого нерва используют следующее сочетание:

- А GI4, GI10, GI20, V60
- Б TR17, V2, E4, GI20
- В E4, E6, IG18, E36
- Г MC6, MC8, P7, P9

При невралгии III ветви тройничного нерва используют следующее сочетание точек:

- А TR17, E7, E6, VB20
- Б GI19, E2, E3, E4
- В TR20, VB3, VB14, V10
- Г GI4, GI20, E36,VC17

При синдроме запястного канала используют следующее сочетание точек

- А V11, MC4, MC6, MC7, IG15
- Б P1, P2, V13, V14, V15, V18
- В TR11, IG8, V10, GI11, GI4
- Г V11, C2, IG15, IG8, TR2

При писчем спазме используют следующее сочетание точек:

- А IG8, IG10, C7, TR5

- Б TR6, TR8, TR15, V11
- В VB21, VB 39, GI4, GI10
- Г MC5, MC6, P7, P9

Тактика ведения больного с постгерпетической невралгией:

- А Назначить курс ИРТ по окончании приема антиконвульсантов;
- Б Отказать в лечении, т.к. больной принимает фармакотерапию
- В Назначить курс ИРТ наряду с применением фармакотерапии и использовать следующие точки воздействия: V13, V15, V19, E18, R23, R24, VC17, GI4;
- Г Назначить баночный массаж

Каким приказом рефлексотерапия включена в номенклатуру врачебных специальностей

- А № 541-н от 23.07.2010 г
- Б № 38 от 03.02.1999 г
- В № 705-н от 09.12.2008 г и № 541-н от 23.07.2010 г
- Г № 364 от 10.12.97г.

Тактика ведения больного с хроническим сиалоаденитом:

- А Отказать в проведении рефлексотерапии
- Б Отдаленные точки ян-меридианов (GI4, GI11, TR5, VB43) тонизировать, точки инь-меридианов-гармонизировать
- В Назначить массаж и фармакопунктуру
- Г Седатировать точки общего действия E36, GI4, GI11

Выбрать эффективное сочетание точек для лечения невралгии лицевого нерва

- А V11, VB21, VB39, V40
- Б GI4, GI10, GI20, V60
- В IG18, IG19, E8, E36
- Г TR17, V2, E4, GI20

Аурикулярные точки при невралгии VII черепно мозгового нерва

- А 411, 29, 8, 84
- Б 11, 29, 8, 84
- В 34, 22, 24, 100, 90
- Г 13, 9, 8, 11, 15

Аурикулярные точки при цервикалгии

- А 55, 102, 31, 51, 101

Б 42, 39, 13, 55
В 41, 37, 13, 63, 55
Г 13, 9, 8, 11, 15

Аурикулярные точки при торакалгии

А 55, 102, 31, 51, 101
Б 41, 37, 13, 63, 55
В 34, 22, 24, 100, 90
Г 42, 39, 13, 55

Аурикулярные точки при бронхиальной астме

А 41, 37, 13, 63, 55
Б 55, 102, 31, 51, 101
В 34, 22, 24, 100, 90
Г 42, 39, 13, 55

Аурикулярные точки при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки

А 55, 102, 31, 51, 101
Б 41, 37, 13, 63, 55
В 34, 22, 24, 100, 90
Г 87, 51, 34, 55

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при головокружении

А VB20; V10; P7; Gi4; VG14
Б MC6; RP6; VG14; E36; R6,F3
В VC12,15; E25; RP4,6; MC6
Г C3,C7,C9; MC5

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при страхе, тревоге

А MC6; RP6; VG14; E36; R6,F3
Б C3,C7,C9; MC5
В VB20; V10; P7; Gi4; VG14
Г VC12,15; E25; RP4,6; MC6

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при тахикардии

А MC6; RP6; VG14; E36; R6,F3
Б VB20; V10; P7; Gi4; VG14
В V15; MC6; VA4; R5
Г VC12,15; E25; RP4,6; MC6

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при бессоннице

А MC6; RP6; VG14; E36; R6,F3
Б VB20; V10; P7; Gi4; VG14
В VC12,15; E25; RP4,6; MC6
Г C3,C7,C9; MC5

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при желудочно-кишечных нарушениях.

- А MC6; RP6; VG14; E36; R6,F3
- Б VB20; V10; P7; Gi4; VG14
- В VC12,15; E25; RP4,6; MC6
- Г V15; MC6; VA4; R5

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при поражении I ветви V черепномозгового нерва

- А E5, E6, E7, Gi18, TR17, TR5
- Б V2, V4, , V10, VB14, VB10, TR21, E1, PC3, VB34,
- В E2, E3, E8, TR17, TR2
- Г Gi20, E8, JG18, TR22

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при поражении II ветви V черепномозгового нерва

- А E5, E6, E7, Gi18, TR17, TR5
- Б V2, V4, VB14, PC3, VB34,
- В E2, E3, E8, TR17, TR22
- Г Gi20, E8, JG18, TR22 Gi11, Gi4, JG19 E2

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при поражении III ветви V черепномозгового нерва

- А E2, E3, E8 E5, E6, E7, Gi18, TR17, TR5 TR22
- Б V2, V4, VB14, PC3, VB34,
- В V2, V10, VB10, TR21, E1
- Г Gi20, E8, JG18, TR22

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при поражении I и II ветвей V черепномозгового нерва

- А E5, E6, E7, Gi18, TR17, TR5
- Б V2, V4, VB14, PC3, VB34,
- В V2, V10, VB10, TR21, E1
- Г E8, V2, TR23, Gi20, Gi4

Подобрать БАТ для рефлексотерапии при поражении II и III ветвей V черепномозгового нерва

- А E5, E6, E7, Gi18, TR17, TR5
- Б V2, V4, VB14, PC3, VB34
- В E9, E6, E36, Gi4, Gi20
- Г E2, E3, E8, TR17, TR22

В какой точке начинается внутренний ход меридиана толстой кишки

- A E12
- Б P5
- В GI4
- Г TR8

Из каких сегментов спинного мозга иннервируются легкие:

- A C3-C7
- Б C3-C4
- В C3-C5
- Г C3-C6

Выберите точки в зоне сегментарной иннервации легких :

- A VB 34
- Б VG20
- В P1
- Г VB3

Стимуляция блуждающего нерва вызывает:

- A Расширение бронхов
- Б Замедление перистальтики кишечника
- В Гиперсекрецию желез слизистой оболочки желудка и бронхоспазм
- Г Стимуляция мочеиспускания

Икота представляет собой рефлекторный акт с участием:

- A Симпатических нервов
- Б Языко-глоточного и диафрагмального нервов
- В Тройничного нерва
- Г Блуждающего нерва

Аурикулярные точки представительства органов дыхания находятся в:

- A Козелке
- Б В нижней части полости ушной раковины
- В Чаше раковины
- Г Завитке

У каких больных с заболеваниями органов дыхания показана рефлексотерапия как самостоятельный метод:

- A У больных с легкой и средней тяжестью заболевания, старше 50 лет без выраженных органических изменений

- У больных с тяжёлой степенью заболевания, с выраженными органическими изменениями в органах
- В У больных до 50 лет
- Г С острой фазой инфекционного процесса

Последовательность стадий развертывания приступа бронхиальной астмы

- А Патохимическая - патофизиологическая – иммунологическая
- Б Иммунологическая - патохимическая – патофизиологическая
- В Патофизиологическая - патохимическая –иммунологическая
- Г Иммунологическая - патофизиологическая – патохимическая

Преобладание какого отдела вегетативной нервной системы выявляется при приступе бронхиальной астмы:

- А Симпатический отдел вегетативной нервной системы
- Б Комбинированно (симпатический и парасимпатический отделы)
- В Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы
- Г Оба отдела ВНС находятся в состоянии угнетения

С какой точки начинается внутренний ход меридиана легких

- А F5
- Б G14
- В VC12
- Г C7

Основные методы рефлексотерапии, используемые при лечении хронического бронхита, бронхиальной астмы

- А I Тормозный
- Б II Тормозный; II возбуждающий
- В I Возбуждающий
- Г Гармонизирующий

Когда и как используется микроиглотерапия при бронхиальной астме:

- А При астматическом статусе

- Б В межприступном периоде любой стадии заболевания как поддерживающая терапия
- В В период приступа
- Г Вместе с гормонами

Основной симптом бронхиальной астмы:

- А Постоянный кашель
- Б Инспираторная одышка
- В Экспираторная одышка
- Г Редкое дыхание

Наиболее значимое осложнение дисрегуляции вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы:

- А Отек Квинке
- Б Мерцательная аритмия
- В Облитерирующий эндартериит
- Г Мигрень

На сколько меняется ЧСС при проведении ортостатической пробы в норме:

- А 2-5 ударов в минуту
- Б 6-10 ударов в минуту
- В 11-24 удара в минуту
- Г 25-30 ударов в минуту

Разница температуры симметричных участков кожи в норме составляет:

- А До 1°
- Б До 0,6°
- В До 0,3°
- Г До 0,1°

Какие сегменты вовлечены в кардиальную иннервацию:

- А Д1-Д5
- Б С4-С6
- В С5-С7
- Г С3-С5

Выбрать точки сегментарной иннервации сердца:

- А VC20, VC17 и TR5
- Б V15, VC17 и GI7
- В VC17, VC20 и GI7
- Г TR5, GI7 и VC20

Активация симпатической нервной системы вызывает:

- А Повышение артериального давления

- Б Учащение пульса
- В Повышение артериального давления и учащение пульса
- Г Понижение артериального давления

На какие меридианы надо воздействовать при синдроме шао-ян (тип бронхиальной астмы)

- А печени
- Б сердца
- В почек
- Г желчного пузыря и трех обогревателей

При какой стенокардии рекомендована рефлексотерапия:

- А Стабильной стенокардии напряжения (I-ПФК)
- Б Стабильной стенокардии напряжения III ФК
- В Нестабильной стенокардии
- Г Стабильной стенокардии напряжения IV

Последовательность назначения методов рефлексотерапии при ВСД по гипотоническому типу:

- А Возбуждающий метод, затем - тормозной
- Б Тормозной метод, затем возбуждающий
- В I Вариант возбуждающего метода, затем II вариант возбуждающего метода
- Г I Вариант тормозного метода, затем II вариант тормозного метода

Выбрать точки при кардиалгическом синдроме:

- А V15, C5, MC3
- Б C5, E 17, MC3
- В VG 18, V15, E17
- Г E17, V15, GI 13

Какие аурикулярные точки используют при аритмиях

- А Сердца и шэнь-мэнь
- Б Надпочечника
- В Симпатическая
- Г Кора головного мозга

Выбрать БАТ для лечения дебюта гипертонической болезни:

- А C7, RP4, MC6
- Б P7, P9, TR5
- В E36, RP10, RP15
- Г V60, V31, V30

Подобрать аурикулярные точки при гипотонии:

- А Шэнь-мэнь
- Б Симпатическая
- В Сердце и надпочечники
- Г Кора головного мозга

Укажите точки зоны сегментарной иннервации пищевода:

- А G14 и VB34
- Б V14 и E16
- В E18 и G14
- Г E25 и E13

Стимуляция какого нерва сопровождается ослаблением сердечной деятельности:

- А Блуждающего нерва
- Б Тройничного нерва
- В Межреберного нерва
- Г Симпатического нерва

Стимуляция блуждающего нерва вызывает :

- А Спазм сфинктера желчного пузыря
- Б Вегетативные реакции
- В Выброс желчи в 12-перстную кишку и активацию синтеза гликогена
- Г Снижение моторики кишечника

При каких заболеваниях желудочно-кишечного тракта показана рефлексотерапия:

- А Гепатит С
- Б Хронический гастрит
- В Цирроз печени
- Г Острый гнойный аппендицит

Из каких сегментов иннервируется желудок:

- А Д7-Д9
- Б Д5 -Д7
- В Д6-Д8
- Г Д4-Д6

Что входит в эффекторную часть дуги рвотного рефлекса:

- А Блуждающий и диафрагмальный
- Б Языкоглоточный
- В Межреберный

Г Слуховой

Выберите БАТ зоны сегментарной иннервации сердца :

А VC20, VC17, TR5
Б VC17, VC20, IG7
В V15, VC17, GI7
Г GI7, VC20, TR5

В дебюте гипертонической болезни используются следующие БАТ:

А RP6, E36
Б MC6, MC7
В VG14, RP4
Г V60, V31

Основной метод воздействия при бронхиальной астме это:

А Возбуждающий
Б Тормозный
В Комбинированный
Г Гармонизирующий

Сочетание бронхиальной астмы, метеоризма и сердцебиений требует использования:

А E25, E36
Б R17, R22
В E36, MC7
Г P7, R6

Какие точки следует использовать у б-го с удаленной долей легкого по поводу саркоидоза для усиления действия анальгетиков:

А C7, RP6, R4
Б VG20, V7, VG16
В P7, P1, V13, VC17
Г V10, V17, V23

Выберите рецепт для лечения артериальной гипертензии с сопутствующей бессонницей:

А VC12, VC14, GI14, E36
Б TR10, TR16, MC7
В V10, V17, V23
Г V28, VC4, R12, RP6

Подберите рецепт при обострении язвенной болезни желудка:

А RP6, VG12, VG4, VB40

- Б MC9, MC6, TR23, V10
- В F1, R2, VB40, V10
- Г E 36, E44, RP4, V20

Выберите рецепт для лечения бронхиальной астмы в межприступный период:

- А VB20, R1, RP4, RP6
- Б RP4, P1, V13, R2, R6
- В R5, F3, VG4, IG4
- Г P1, P7, V13, VB21, GI4

Выбрать точки для купирования обморочных состояний при ВСД*

- А VG10, VC5
- Б GI4, E36, E45
- В VB1, VB3, VG8
- Г GI17, GI18, VG3

Выберите группу БАТ при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки:

- А RP6, F13, V17, V23
- Б P2, P5, G4, V11, V13
- В E36, E45, VC12-15, V20
- Г RP4, V18-25, F3, VC12

Выберите группу БАТ при остром и хроническом бронхите:

- А RP6, F13, V17, V23
- Б P2, P5, G4, V11, V13
- В E36, E45, VC12-15, V20
- Г RP4, V18-25, F3, VC12

Выберите группу БАТ при дискинезии желчного пузыря

- А VB34, VB40, V18-24
- Б RP6, F13, V17, V23
- В P2, P5, G4, V11, V13
- Г E36, E45, VC12-15, V20

Выберите группу БАТ при сахарном диабете:

- А P2, P5, G4, V11, V13
- Б RP6, F13, V17, V23
- В E36, E45, VC12-15, V20
- Г RP4, V18-25, F3, VC12

Выберите группу БАТ при гепатитах:

- А RP6, F13, V17, V23
- Б P2, P5, G4, V11, V13
- В E36, E45, VC12-15, V20

Г RP4, V18-25, F3, VC12

Выберите группу БАТ при снижении АД

А MC6, RP4, RP6, E19-45, F1-3
Б VG15, VG 20, VB19-21
В MC6-8, V15, V19, VB39, E36
Г RP4, RP6, V20-22, R7

Выберите группу БАТ для снижения повышенного уровня инсулина:

А MC6, RP4, RP6, E19-45, F1-3
Б VG15, VG 20, VB19-21
В RP4, RP6, V20-22, R7
Г MC6-8, V15, V19, VB39, E36

Выберите группу БАТ при дислипидемии

А MC6, RP4, RP6, E19-45, F1-3
Б VG15, VG 20, VB19-21
В MC6-8, V15, V19, VB39, E36
Г RP4, RP6, V20-22, R7

Выберите группу БАТ для улучшения мозгового кровотока

А MC6, RP4, RP6, E19-45, F1-3
Б VG15, VG 20, VB19-21
В MC6-8, V15, V19, VB39, E36
Г RP4, RP6, V20-22, R7

Выберите группу БАТ для стимуляции сниженной функции щитовидной железы.

А MC6, RP4, RP6, E19-45, F1-3
Б VG15, VG 20, VB19-21
В MC6-8, V15, V19, VB39, E36
Г VC17, VC 21, VG14, TR5

Выберите группу БАТ для купирования астматического приступа:

А V20, V40, V60
Б P2, P5, P7, V13
В VG20, VG26, E40
Г VB38, VB39, GI4

Выберите группу БАТ для купирования коллапса (шока):

А VC17, MC6, MC9
Б RP, R7, VG26
В V20, V40, V60
Г P2, P5, P7, V13

Выберите группу БАТ для купирования стенокардии

- А RP, R7, VG26
- Б V20,V40, V60
- В P2, P5, P7, V13
- Г C9, P7,VC14

Выберите группу БАТ при непроходимости кишечника

- А C9, P7,VC14
- Б RP, R7, VG26
- В V20,V40, V60
- Г GI11, TR4,VC6,VC12,E25,E36,V20

Выберите группу БАТ для купирования отека Квинке

- А RP, R7, VG26
- Б E36, GI10, аурикулярные точки: 13,22,34,55
- В P2, P5, P7, V13
- Г VG20, VG26, E40

При невралгии левого затылочного нерва используют следующее сочетание точек :

- А V26, V27, V32, V54
- Б V64,VB40,E36,R10
- В TR14,V44,V45,VG10
- Г V10,VB20,VB12,TR17

Какое чувство исчезает при операционной иглоаналгезии:

- А Давления
- Б Растяжения
- В Боли
- Г Тепла

Противопоказания для иглоаналгезии

- А Плановой операции
- Б Отсроченной операции;
Низкая физиологическая
- В предрасположенность к акупунктурной
аналгезии
- Г Срочной операции;

За какое время до операции определяют «физиологическую предрасположенность» больного к иглоаналгезии:

- А 3 часа
- Б 6 часов
- В 12 часов
- Г 24 часа

Когда наступает эффект иглоаналгезии:

- А 5-10 мин.
- Б 10-15 мин.
- В 20-30 мин.
- Г 40-50 мин.

За какое время до операции начинаю проводить иглоаналгезию:

- А 20 мин.
- Б 30 мин.
- В 40 мин.
- Г 50 мин.

Акупунктурная аналгезия не эффективна при длительности операции более:

- А 1 часа;
- Б 2 часов;
- В 3 часов;
- Г 30 минут

Премедикация при акупунктурной аналгезии

- А противопоказана
- Б не требуется
- В обязательна при малых операциях
- Г обязательна при больших операциях

Методы акупунктурной аналгезии

- А корпоральная
- Б аурикулярная
- В поверхностная иглотерапия
- Г двухсторонняя корпоральная, аурикулярная, электроакупунктура, фармакопунктура

Что усиливает эффект акупунктурной аналгезии

- А прогревание
- Б поверхностная иглотерапия
- В криотерапия
- Г электроакупунктура

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при офтальмологических операциях:

- А АТ 33, 33а, 40, 37
- Б АТ 24а, 24б, 51, 33
- В АТ 5, 53, 117, 43
- Г АТ 74, 94, 16, 17

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при гастрэктомии:

- А АТ 87, 91, 89, 98, V17, V21;
- Б АТ 99, 37, 40, 56, GI4, E35;
- В АТ 51,40, 34, 8, F3, VG4;
- Г АТ 21, 4, 16, 36, E2, E6;

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при спленэктомии:

- А АТ 78, 37, 15, V20;
- Б АТ 98, 13, V17, V19;
- В АТ 100, 21, GI4, F3;
- Г АТ 83, 40, GI7, F14;

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при холецистэктомии :

- А АТ 98, 96, V17,V19;
- Б АТ 35, 63, TR3, TR17;
- В АТ 17, 21, E36, E6;
- Г АТ 43, 14, E44, TR;

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при операции на почках:

- А АТ 40, 11, VC4, MC6;
- Б АТ 43, 56, E44, MC17;
- В АТ 92, 28, V19, V21, V23;
- Г АТ 25, 37, TR3, V19;

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при аппендэктомии :

- А АТ 68, 69, 51, 91, 89;
- Б АТ 64, 65, 56, 72, 80;
- В АТ 17, 24, 29, 33, 81;
- Г АТ 45, 76, 18, 13, 8;

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при гинекологических операциях :

- А АТ 22, 23, 58, 55, 56
- Б АТ 18, 13, 45, 7, 8
- В АТ 4, 93, 7, 6, 18
- Г АТ 26, 8, 34, 26, 21

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при струмэктомии:

- А АТ 15, 45, 55, 51,GI4
- Б АТ 17, 30, 87, 40, E36
- В АТ 31, 35, 72, 39, E7
- Г АТ 7, 21, 40, 55, TR3

Выберите комбинацию БАТ для иглоаналгезии при мастэктомии :

- А АТ 17, 24, 33, 29, V17;

- Б АТ 42, 44, 55, 51, МС6;
- В АТ 81, 13, 25, 7, F2;
- Г 81, 96, 56, 4, VG4;

К синдромам патологии каких меридианов относится язвенная болезнь

- А Легких, печени, почек
- Б Тонкого кишечника, почек
- В Печени, селезенки-поджелудочной железы
- Г Желудка, селезенки-поджелудочной железы

Номера аурикулярных точек козелка

- А с 20 по 21
- Б с 1 по 11
- В с 62 по 71
- Г с 12 по 19

Абсолютным показанием для применения оперативного лечения грыжи межпозвонковых дисков на поясничном уровне являются:

- А Стойкий болевой синдром
- Б Грыжи Шморля
- В Остеопороз
- Г Нарушение функции тазовых органов, нижний парапарез

Какие акупунктурные точки используют при предоперационной подготовке

- А Точки меридиана желудка
- Б Точки меридиана желчного пузыря
- В Точки меридиана легких
- Г Точки общего воздействия дистальных отделов конечности и точки воротниковой области

На какое звено передачи ноцицептивной боли влияет рефлексотерапия

- А Трансдукция
- Б Трансмиссия
- В Нисходящая модуляция
- Г Перцепция, нисходящая модуляция, трансмиссия

Какие принципы используются при выборе зон акупунктурной анальгезии

- А Меридианный и введение игл параллельно разрезу
- Б Использование микроакупунктурных систем уха и носа

- В Использование микроакупунктурных систем уха, носа и корпоральных АТ
- Г Все перечисленное

Что включает предоперационная подготовка при составлении плана применения рефлексотерапии в анестезиологии

- А Информирование пациента о сущности метода
- Б Определение порога болевой чувствительности
- В Изучение сопутствующих заболеваний
- Г Все перечисленное

Для аналгезии в предоперационном и послеоперационном периодах акупунктура дает наиболее выраженный эффект в сочетании с:

- А Физиотерапией
- Б ЛФК
- В Массажем
- Г Электростимуляцией и фармакопунктурой

Для закрепления аналгетического эффекта рефлексотерапии в послеоперационном периоде следует применить:

- А Мануальную терапию
- Б Сегментарный массаж
- В Краниопунктуру
- Г Микроиглотерапию

Для профилактики в послеоперационном периоде гипостатических нарушений в легких наиболее целесообразно применять:

- А Вакуумный массаж и дыхательную гимнастику
- Б Микроиглотерапию
- В Лазеротерапию
- Г Электроакупунктуру

Сочетать лечебные блокады возможно с:

- А Аурикулярной рефлексотерапией
- Б Электрорефлексотерапией
- В Корпоральной иглотерапией
- Г Любым видом рефлексотерапии

При проведении взрослым наружного массажа сердца ладони следует расположить:

- А на верхней трети грудины
- Б грудины
- В на границе средней и нижней трети грудины
- Г над мечевидным отростком

При лечении сенсорной и моторной афазии после перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения эффективно сочетание точек:

- А . P1, P3, P7, VC12, VC17, F13, F3
- Б . C7, C5, V GI4, V IO, PC22, PC20
- В . R6, R7, RIO, VC4, E38
- Г . E 4, E 6, GI 19, GI 4,P 7

Больной ориентирован, приоткрывает глаза на просьбу, при обращении дает правильные, но замедленные ответы. Оценка по шкале Глазго:

- А 15 баллов (ясное сознание)
- Б 12 баллов (глубокое оглушение)оглушение
- В 9-11 баллов (сопор)
- Г 6-5 баллов (глубокая кома)

Больной в ответ на болевое раздражение приоткрывает глаза, непостоянная защитная реакция на сильное раздражение, при обращении произносит бессвязные слова. Оценка по шкале Глазго:

- А 15 баллов (ясное сознание)
- Б 13 баллов (умеренное оглушение)
- В 9-11 баллов (сопор)
- Г 6-5 баллов (глубокая кома)

Больной на словесное обращение не реагирует, при сильном болевом раздражении появляются тонические сгибательные и разгибательные движения в конечностях, дыхание сохранено. Оценка по шкале Глазго:

- А 15 баллов (ясное сознание)
- Б 13 баллов (умеренное оглушение)
- В 9-11 баллов (сопор)
- Г 6-5 баллов (глубокая кома)

Первая помощь пациенту при потере сознания вовремя сеанса рефлексотерапии

- А Краниопунктура
- Б Аурикулопунктура
- В Фармакопунктура
- Г Прессация VG26 или укол в RP1

Какие точки нельзя применять при беременности

- А GI4, VC4, RP6, V60
- Б Точки воротниковой области
- В Дистальные точки конечностей
- Г Аурикулярные точки

Непрямой массаж сердца проводится в ритме:

- А 10-20 надавливаний в минуту
- Б 50-60 надавливаний в минуту
- В 70-80 надавливаний в минуту
- Г 90-120 надавливаний в минуту

Искусственное дыхание без использования аппаратов следует проводить в следующем ритме:

- А 3 раздувания в легких в 1 минуту
- Б 8-10 раздуваний в легких в 1 минуту
- В 20 раздуваний в легких в 1 минуту
- Г 24 раздуваний в легких в 1 минуту

Индивидуальный цунь человека равен:

- А 5 см
- Б 4 см
- В 2 см
- Г 1,5-3 см в зависимости от длины пальцев

Стандартное число прогортационных цуней на голени

- А 5.
- Б 10.
- В 12.
- Г 16.

Какие иглы получили наибольшее распространение в современной медицине

- А Медные
- Б Железные
- В Платиновые
- Г Стальные

Какой из признаков не является частью синдрома Горнера?

- А боль
- Б миоз
- В энофтальм
- Г птоз

Сколько "чудесных" меридианов известно в рефлексотерапии

- А 5.
- Б 7.
- В 12.
- Г 8.

Как называется включающая точка "чудесных" меридианов

- А точка Ло
- Б точка Шу
- В точка-ключ (командная точка)
- Г точка-посбник

Назовите противоболевую точку I пары чудесных меридианов

- А VB35
- Б R8
- В V59
- Г R9

Назовите противоболевую точку II пары чудесных меридианов

- А VB35
- Б R8
- В V59
- Г R9

Назовите противоболевую точку III пары чудесных меридианов

- А VB35
- Б R8
- В V59
- Г R9

Назовите противоболевую точку IV пары чудесных меридианов

- А VB35
- Б R8
- В V59
- Г R9

Выбрать БАТ при травматической невропатии локтевого нерва:

- А P1, P7, VC12, VG14
- Б VB30, VB34, AT53, AT50
- В P3, P7, VG14, IG4, IG10
- Г R7, MC5, P5, AT53

Выбрать БАТ при травматической невралгии срединного нерва:

- А P3, P5, GI14, IG7, GI4
- Б IG15, TR13, TR9, TR5, MC6
- В VG14, MC3, TR2, TR1, TR10
- Г C1, C4, IG7, IG12, IG9

Выбрать БАТ для купирования боли при пяточной шпоре:

- А V40, V54, GI4, E36
- Б V60, RP4, F5, E43
- В E39, E45, VB30, E40
- Г E35, E33, RP9, E36

Выбрать БАТ для купирования боли при травме голеностопного сустава:

- А E36, VG20, GI4, RP6
- Б V60, RP4, P3, F1, F4
- В V43, GI 11, V60, MC6
- Г VG20, C7, VG11, VG14

Выбрать БАТ для купирования боли при травме коленного сустава:

- А RP4, RP5, RP6, RP9, E36
- Б R3, R8, F2, VB36, VB39
- В F8, R10, E34, E35, V40
- Г V23, V25, V27, V39, V41

Выбрать БАТ для купирования болей в плечевых суставах при артрите:

- А GI4, IG4, TR5, VB41, VB43
- Б IG4, IG10, IG15, TR5, TR15
- В E35, E33, RP9, V54, V60
- Г VB29, VB30, V55, VB41

Выбрать БАТ при артрозе тазобедренного сустава с болевым симптомом:

- А GI 10, VB24, E19, AP55
- Б VB29, VB30, VB34, AP50
- В F13, R21, VC14, AP31
- Г E25, RP17, R25, AP34

Какие меридианы поражаются при аменорее

- А Печени
- Б Почек

В Желчного пузыря
Г Печени, почек, селезенки-поджелудочной железы

Главные акупунктурные точки при наркотическом абстинентном синдроме

А VG20, VB20, VG14, VC12, E36, RP6, VC17, VC4, GI4, MC6
Б VG14
В F5
Г R7

Главные акупунктурные точки при сахарном диабете

А V20, V23, E36, RP6, PC85
Б VG20
В MC6
Г E36

Главные акупунктурные точки при хроническом бронхите

А V13, VC17, P1, VC22
Б VG14
В F5
Г R7

Дополнительные точки при хроническом бронхите

А VG20
Б MC6
В E36, V20, E40, VC6, P10
Г VC3

Пароксизмальная тахикардия (выбрать точку воздействия)

А VG20
Б MC6
В E36
Г VC3

Какие точки используют для прижигания при хроническом бронхите

А V13, V43, VG12, VG14, V20
Б MC6
В E36
Г VC3

Астено-невротический синдром (выбрать точку воздействия)

А VG20
Б MC6

В E36
Г VC3

Методы прижигания при хроническом бронхите

А через жень-шень
Б через толокнянку
В полынные конусы и через имбирь
Г угольные сигары

Аурикулярные точки при хроническом бронхите

А AP103, AP 101, AP 42
Б AP 12, AP15
В AP 24, AP 56
Г AP58, AP43

Какой меридиан используется для баночного массажа при хроническом бронхите

А желчного пузыря
Б первая и вторая линии меридиана мочевого пузыря
В сердца
Г печени

Висячая кисть с выпадением чувствительности на тыле внутренней стороны - следствие

А Поражения срединного нерва
Б Поражения малоберцового нерва
В Поражения бедренного нерва
Г Поражения лучевого нерва

«Когтистая кисть». Полная анестезия в области мизинца, гипотрофия гипотенара - следствие:

А Поражения локтевого нерва
Б Поражения большеберцового нерва
В Поражения мышечно-кожного нерва
Г Поражения медиального кожного нерва предплечья

Нарушение пронации и ладонного сгибания - следствие:

А Поражение малоберцового нерва
Б Поражение срединного нерва
В Поражение бедренного нерва
Г Поражение лучевого нерва

Нарушение разгибания голени в коленном суставе, слабость мышц бедра, гипестезия четырёхглавой мышцы - следствие:

- А Поражения срединного нерва
- Б Поражения малоберцового нерва
- В Поражения бедренного нерва
- Г Поражения лучевого нерва

При поражении какого нерва наблюдается симптоматика: стопа свисает вниз, хождение на носках невозможно

- А Поражение срединного нерва
- Б Поражение малоберцового нерва
- В Поражение бедренного нерва
- Г Поражение лучевого нерва

Рефлексотерапия при боли в плечевом суставе (подобрать группу БАТ)

- А R2, VC12, VC15
- Б P9, V17, RP6
- В GI15, E37, VB39
- Г GI15, TR14, IG10, IG11, GI4, TR5

Рефлексотерапия при болевом синдроме в локтевом суставе (подобрать группу БАТ)

- А R2, VC12, VC15, MC7
- Б GI11, GI10, IG8, TR10, GI4, TR5
- В GI15, E37, VB39
- Г VG26, GI4, E36

Рефлексотерапия при болевом синдроме в лучезапястном суставе (подобрать группу БАТ)

- А VG23, VG24, VB20
- Б GI5, IG4, TR4, IG6, GI4, TR5
- В TR5, VB8, VB21, VB39
- Г MC6, C7, E36

Снижение артериального давления (подобрать группу БАТ)

- А VG23, VG24, VB20
- Б VG20, VG14, R7
- В TR5, VB8, VB21, VB39
- Г MC6, C7, E36

Остановка носового кровотечения (подобрать группу БАТ)

- А VG23, VG24, VB20

Б VG20, VG14, R7
В TR5, VB8, VB21, VB39
Г MC6, C7, E36

Рефлексотерапия при болевом синдроме в коленном суставе (подобрать группу БАТ)

А VB30, VB31, VB54, V60
Б E36, VB43, V60
В R2, VC12, VC15, MC7, C7
Г TR5, VB8, VB21, VB39

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме у больных с артрозом стерно-костального сочленения на уровне 3-4 го рёбер

А E35, V36, V40, VB34, RP9, V61
Б E40, V61, V60
В R25, R24, V13, GI4
Г VB30, VB31, VB54, V60

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме у больных с коксартрозом

А E35, V36, V40, VB34, RP9, V61
Б E40, V61, V60
В R25, R24, V13, GI4
Г VB30, VB31, VB54, V60

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме суставов кисти

А R25, R24, V13, GI4
Б IG3,GI4, GI11, TR5
В E40, V61, V60
Г R25, R24, V13, GI4

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме в голеностопном суставе

А R25, R24, V13, GI4
Б E41, V62, V60, VB40,R6
В R25, R24, V13, GI4
Г VB30, VB31, VB54, V60

Главные акупунктурные точки при аллергическом рините

А GI20,GI4,PC3,VG20,E36,VB20
Б R25, R24, V13, GI4
В VB30, VB31, VB54, V60
Г .R1, RP4, E36

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме на тыле стопы

- А V61, V62, P3, RP9, VB4
- Б E38, V57, V58, RP6, RP9,
- В R1, RP4, E36
- Г V66, RP3, VB39, E36

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме под внутренней и наружной лодыжками

- А V61, V62, P3, RP9, VB4
- Б E38, V57, V58, RP6, RP9,
- В R1, RP4, E36
- Г E41, E42, E43, RP5

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме в межплюсневых промежутках стоп

- А E38, V57, V58, RP6, RP9,
- Б R1, RP4, E36
- В VB41, VB43, F2-3, E43, E44
- Г E41, E42, E43, RP5

Подобрать группу БАТ при болевом синдроме в мышцах голени, вследствие перегрузки

- А E38, V57, V58, RP6, RP9,
- Б R1, RP4, E36
- В VB41, VB43, F2-3, E43, E44
- Г E41, E42, E43, RP5

Главные аурикулярные точки при цистите

- А AP58,59
- Б AP92,43,56,95,104,13
- В AP35,100
- Г AP25,38

Какие меридианы используют для лечения заболеваний мочевого пузыря

- А Печени
- Б Сердца
Мочевого пузыря, селезенки и
- В поджелудочной железы, передний
срединный меридиан
- Г Перикарда

Главные акупунктурные точки при цистите

- А VC3, V28, RP6
- Б R3, R9, F8, AP5,8,34
- В VC2, VC14, VG20,16,
- Г RP6, F11, R2, AP11,13

БАТ каких меридианов используют при климаксе:

- А тонкой кишки
- Б задний срединный меридиан
- В перикарда, передний срединный меридиан, трех обогревателей
- Г почек

Тактика рефлексотерапевта при зудящих дерматозах без пиодермии

- А Рефлексотерапия показана
- Б Консультация психотерапевта, дерматолога
- В Установить рациональный режим жизни и питания
- Г Все перечисленное

Рефлексотерапия оказывает при кожных заболеваниях действие:

- А Противоболевое
- Б Симптоматическое
- В Седативное
- Г Все перечисленное

Выбрать эффективное сочетание меридианов при кожных болезнях :

- А TR и VB + VC
- Б P и R + VC
- В MC и RP + VC
- Г GI +E + F+RP+V

Методы рефлексотерапии, наиболее широко применяющиеся в дерматологии

- А Точечный массаж
- Б Вакуумный массаж
- В Прогревание, акупунктура, лазеропунктура
- Г Электropунктура

При токсикозе беременности наиболее показаны точки:

- А GI4, P7
- Б V4, P10
- В RP4, MC6. GI10, E36
- Г IG5, C7

При родовой слабости показано следующие воздействие

- А гармонизирующего способа
- Б I вариант тормозного способа
- В I вариант и II вариант возбуждающего способа

Г II вариант тормозного способа

Стимулирующие точки для родовой деятельности:

А P1, MC3, V5
Б P7, GI4
В GI2, F5, V11
Г TR5, VB34, VB43 GI4, E38, E44

Выбрать БАТ для стимуляции отделения плаценты точки:

А IG 3, V62, V65
Б TR5, TR8, VB41
В MC6, MC8, F2, F3
Г GI4, RP6, V60, VC3

При гипогалактии целесообразно использовать комбинацию БАТ:

А MC9, RP 6, F3 , GI10
Б IG3, C7, C3, C5
В P7, R 6, E44;
Г C1, C7, E18, E15

Наиболее оптимальной схемой рецептов точек при гинекологических заболеваниях являются:

А GI 10, E36, E25, ухо: т.т. яичников, шэнь-мэнь; TR 5, V41, V25, ухо: т. желез внутренней секреции
Б MC4, P7, MC6, ухо: т.т. крестца, почки
В P7, GI11 ухо: т. надпочечники
Г IG5, V11, VG 20 , ухо: т. надпочечники

При климаксе проводят микроиглотерапию по следующим БАТ:

А TR5, TR22, VB34, VB12
Б GI10, E36, GI15, VG14
В VC5, VC15, V21, P4
Г MC6, RP 6, RP10, RP21

При болевом синдроме вследствие тонзиллита показаны

А I вариант и II вариант тормозного способа
Б I вариант возбуждающего способа
В гармонизирующее воздействие
Г II вариант возбуждающего способа

Основные аурикулярные точки при псориазе

А AP56,28
Б AP101, 29, 22

В AP 15,34
Г AP56, 12

Основные акупунктурные точки при псориазе

А P5,P9, TR5, F8, E41, E36, C5, C7
Б V1, TR23, GI4, IG18; E2
В VB1, VB2, VB34, V2
Г VC5, VC15, V21, P4

Рефлексотерапия эффективна при:

А Блефароспазме
Б Дальтонизме
В Катаракте
Г Астигматизме

При атопическом дерматите подострого течения используют:

А I BBM - TR5,VB41
Б IBBM - IG3,V62
В ГМ - IG6,VB34
Г II BTM - TR5,VB41

Выберите эффективное сочетание точек при опоясывающем лишае:

А GI1, R7, V40, MC5
Б R5, C7, P3, V11
В P7, GI11, GI4, F8
Г VG3, MC6, TR4, TR8

Эффективное сочетание точек при зубной боли в верхней челюсти:

А E45, E44, IG1
Б G1, G11, E45
В P9, E44, IG1
Г VG20, V67, F7

Выберите эффективное сочетание точек при дисменорее:

А V11, VB21 - ПBTM
Б R3, GI4 - IBBM
В RP6, RP8 ГМ
Г V22, V23 II BTM

Выберите эффективное сочетание точек при остром правостороннем отите

А TR21, IG19,VB2,TR17
Б VB12, P11, E366 VC22
В VB20, C7, GI11, TR21
Г E38,E36, VC21, VC22

Выберите эффективное сочетание точек при состоянии после аппендэктомии с тошнотой и многократной рвотой

- А GI4, GI11, E36, RP6
- Б R6, VC12, MC6, E36
- В C7, E40, RP3, R3
- Г IG19, VB2, VB20

Выберите вариант рефлексотерапии при хроническом аднексите:

- А Постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки VC3,14, RP6, GI4 на 20-30 минут
- Б Рефлексотерапия при этом заболевании неэффективна
- В Постановка акупунктурных игл в точки VG20, V7, IG20, GI4, VB20, E5 на 5 минут
- Г Постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки VG20, V7, IG20, GI4, VB20, E5 на 20-30 минут

Выберите эффективное сочетание точек при климактерических «приливах»

- А Постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки V21, TR8, VB35, R5
- Б Постановка акупунктурных игл по ПВВМ в точки ши-сюань на правой руке
- В Постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки E36, RP6, C7, VB6
- Г Постановка акупунктурных точек по ПВВМ в точки RP5, VB35, V59, E43

Какое сочетание БАТ наиболее эффективно при «афтозном стоматите»:

- А постановка аурикулярных микроигл в точки AP100, AP92, AP59 на 5 дней
- Б постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки VC3, VC14, RP6, GI4 на 20-30 минут
- В постановка акупунктурных точек по ПВВМ в точки RP5, VB35, V59, E43, RP13, RP15
- Г постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки E6, E7, GI10, GI11, E4, E6, прогревание этих точек полынной сигарой, кратковременный поверхностный укол трехгранной иглой до появления капельки крови в точку цзинь-цзинь-юй-е (H)

Выберите метод рефлексотерапии при гайморите

- А Рефлексотерапия противопоказана

- Б Постановка акупунктурных игл по ПВТМ в точки VG20, V7, IG20, GI4, E5 на 20- 30 минут.
- В Постановка акупунктурных игл по ПВВМ в точки VG20, V7, IG20, GI4, E5 на 3 минуты
- Г Постановка акупунктурных игл по ПВВМ в точки VC3, GI4, RP6, RP2 на 5 мин.

Тонизирующая точка меридиана селезенки и поджелудочной железы

- А RP 2
- Б RP 3
- В RP 4
- Г RP 5

Седативная точка меридиана селезенки и поджелудочной железы

- А RP 2
- Б RP 3
- В RP 4
- Г RP 5

Точка-пособник меридиана селезенки и поджелудочной железы

- А RP 2
- Б RP 3
- В RP 4
- Г RP 5

Противоболевая точка меридиана селезенки и поджелудочной железы

- А RP 3
- Б RP 4
- В RP 5
- Г RP 8

Ло-пункт меридиана селезенки и поджелудочной железы

- А RP 3
- Б RP 4
- В RP 5
- Г RP 8

Седативная точка меридиана перикарда

- А MC 1
- Б MC 4
- В MC 6
- Г MC 7

Точка-пособник меридиана перикарда

- А MC 1

Б МС 4
В МС 6
Г МС 7

**Противоболевая точка меридиана
перикарда**

А МС 1
Б МС 4
В МС 6
Г МС 7

Ло-пункт точка меридиана перикарда

А МС 1
Б МС 4
В МС 6
Г МС 7

**Тонизирующая точка меридиана желчного
пузыря**

А VB 36
Б VB 37
В VB 38
Г VB 43

**Седативная точка меридиана желчного
пузыря**

А VB 36
Б VB 37
В VB 38
Г VB 43

**Точка-пособник меридиана желчного
пузыря**

А VB 36
Б VB 37
В VB 38
Г VB 40

**Противоболевая точка меридиана желчного
пузыря**

А VB 36
Б VB 37
В VB 38
Г VB 40

Ло-пункт меридиана желчного пузыря

А VB 36
Б VB 37
В VB 38
Г VB 40

Тонизирующая точка меридиана печени

- А F 2
- Б F 3
- В F 5
- Г F 8

Седативная точка меридиана печени

- А F 2
- Б F 3
- В F 5
- Г F 8

Точка-пособник меридиана печени

- А F 2
- Б F 3
- В F 5
- Г F 8

Противоболевая точка меридиана печени

- А F 2
- Б F 3
- В F 6
- Г F 8

Ло-пункт точка меридиана печени

- А F 2
- Б F 3
- В F 5
- Г F 8

Половая функция представляет совокупность процессов

- А Биологических
- Б Психологических
- В Социальных
- Г Все перечисленное

Уровни терапевтического воздействия при нарушении половой функции

- А Этиотропная терапия
- Б Патогенетическая терапия
- В Стимуляция нарушенных фаз копулятивного цикла
- Г Все перечисленное

Для лечения сексуальных расстройств у мужчин эффективна рефлексотерапия:

- А Корпоральная, аурикулярная
- Б Су-Джок
- В Плантарная
- Г Краниофациальная

Для рефлексотерапии сексуальных расстройств эффективно применение точек:

- А Поясницы, крестца, нижней части живота
- Б Шейного отдела спины
- В Грудной клетки
- Г Задней поверхности ушной раковины

Для коррекции нарушения полового влечения у мужчин эффективны корпоральные точки:

- А RP6, R5, F14
- Б E36
- В P4
- Г C5

Для коррекции нарушения полового влечения у мужчин эффективны аурикулярные точки:

- А 32, 22, 58, 28,13
- Б 28.
- В 31.
- Г 55.

Для коррекции нарушения оргазма у мужчин используются корпоральные точки:

- А VC 1
- Б VC 8
- В RP 12
- Г V 14

Для коррекции нарушения оргазма у мужчин эффективны аурикулярные точки:

- А AP 28
- Б AP 15
- В AP 55
- Г AP 31

Основными формами сексуальных расстройств у женщин являются нарушения:

- А Менструального цикла
- Б Генетические аномалии
- В Гирсутизм
- Г Вагинизм, нарушение полового влечения и оргазма

Основными формами сексуальных расстройств у мужчин являются нарушения:

- А Нарушение сна
- Б Гипогонадизм
- В Вирилизм
- Г Нарушение эрекции, эякуляции и полового влечения

Одновременно с рефлексотерапией при нарушениях половой функции необходимо проводить

- А Психотерапию
- Б Физиотерапию
- В Мануальную терапию
- Г Оперативное лечение

Тактика рефлексотерапевта при воспалительных процессах половых органов

- А Рефлексотерапия показана после противовоспалительной терапии
- Б Прогревание точек
- В Фармакопунктура
- Г Электроakupунктура

Для коррекции нарушения полового влечения у женщин эффективны точки:

- А RP6
- Б V60
- В V 12
- Г MC3

Для коррекции нарушения полового влечения у женщин эффективны аурикулярные точки:

- А AP42
- Б AP28
- В AP14
- Г AP18

Для коррекции нарушения оргазма у женщин эффективны корпоральные точки:

- А VC12
- Б VC14
- В V31
- Г V 4

Тактика лечения рефлексотерапевтом эректильной дисфункции после простатита:

- А Рефлексотерапия показана
- Б Консультация психотерапевта
- В Установить рациональный режим жизни и питания
- Г Все перечисленное

Время назначения электропунктуры при сочетании с классической акупунктурой?

- А За 15 мин.
- Б За 20 мин.
- В За 30 мин.
- Г За 45 мин.

Время назначения вакуум-массажа при сочетании с акупунктурой?

- А За 15 мин.
- Б За 20 мин.
- В За 30 мин.
- Г За 45 мин.

Время назначения поверхностной рефлексотерапии при сочетании с аурикулярной акупунктурой?

- А За 15 мин.
- Б За 20 мин.
- В За 30 мин.
- Г За 45 мин.

Время назначения поверхностной рефлексотерапии в сочетании с акупрессурой?

- А За 5 мин.
- Б За 10 мин.
- В За 30 мин.
- Г За 20 мин.

Время назначения мануальной мобилизации при сочетании с электропунктурой?

- А За 15 мин.
- Б За 20 мин.
- В Через 30 мин.
- Г Через 20 мин.

Акупунктурные точки стимулируют следующим типом импульсного тока:

- А Пикообразным
- Б Диадинамическим

- В Интерференционным
- Г Синусоидальным

Величина болевого порога величины силы тока у человека составляет :

- А 10 мкА
- Б 100 мкА
- В 1 мА
- Г 10 мА

При определении кожной симпатической реакции электроток составляет:

- А 50-100 мкА
- Б 100-150 мкА
- В 150-250 мкА
- Г 250-350 мкА

На каком меридиане находятся традиционные точки пульсов:

- А С
- Б МС
- В Р
- Г GI

При терморефлексотерапии на точку действуют:

- А Магнитным полем
- Б Теплом
- В Лучистой энергией
- Г Переменным током

Для проведения терморефлексотерапии используют диагностику по методу:

- А К.Акабанэ
- Б Й.Накатани
- В А.И.Нечушкина
- Г Р.Фолля

Сколько точек используют при термопунктурной диагностике по методу К.Акабанэ:

- А 12.
- Б 18.
- В 24.
- Г 30.

При прогревании полынной сигарой температура кожи может быть:

- А 13-15°C
- Б 23-25°C
- В 43-45°C

Г 63-65°C

Виды воздействия при дистантной термопунктуре

- А стабильное
- Б прерывистое (клюющее)
- В утюжащее
- Г Все перечисленное

Расстояние от полынной сигары до кожи при прогревании составляет:

- А 0,3 см
- Б 1-3 см
- В 4-5 см
- Г 6-7 см

Продолжительность сеанса «клюющим» методом прижигания составляет:

- А 0,5-1 мин.
- Б 2-5 мин.
- В 5-10 мин.
- Г 20-30 мин.

Продолжительность сеанса стабильным воздействием составляет:

- А 0,5-1 мин.
- Б 2-5 мин.
- В 5-10 мин.
- Г 20-30 мин.